

谷林中、灌丛中或草坡的阴湿处，海拔(1100—)1700—3200米。缅甸北部也有分布。模式标本采自四川康定。

A. Rehder 根据 J. F. Rock 15003 (在甘肃西南部所采的模式标本)发表的 *V. glomeratum* Maxim. var. *rockii* Rehd. in Journ. Arn. Arb. **9**: 115. 1928, 根据其原始记载,与聚花荚蒾的区别不大,仅在于叶较小,长2—3厘米,宽1.3—2.2厘米,椭圆状卵形或卵形,稀圆卵形,顶端钝或稍钝,基部圆或宽楔形,边缘通常疏生不明显的小齿,有3—5对侧脉,叶柄长3—5毫米。因未见模式标本,附志于此,留待考订。

3a. 壮大荚蒾(亚种)(植物分类学报),新组合

***Viburnum glomeratum* Maxim. subsp. *magnificum* (Hsu) Hsu, comb. nov.**——*V. veitchii* C. H. Wright subsp. *magnificum* Hsu in Acta Phytotax. Sinica **11**: 75, fig. 13. 1966.

叶较宽大,卵状矩圆形至卵形,长10—19厘米,宽4.5—11.5厘米,顶端渐尖或短渐尖,基部微心形;叶柄长2—3厘米。花序径8—10厘米,第一级辐射枝7条;萼筒长约4毫米,萼齿长0.5毫米;花冠直径约7毫米,裂片近圆形,长约2毫米,略长于筒部;雄蕊高出花冠筒。果实矩圆形,长1.3厘米;核椭圆状长圆形,长9—11毫米,直径约6毫米。花期4月,果熟期9—10月。

产安徽西部、浙江西北部和江西(庐山)。生于山谷林下蔽荫处,海拔600—960米。模式标本采自浙江天目山。

3b. 圆叶荚蒾(亚种)(植物分类学报),新组合

***Viburnum glomeratum* Maxim. subsp. *rotundifolium* (Hsu) Hsu, comb. nov.**——*V. veitchii* C. H. Wright subsp. *rotundifolium* Hsu in Acta Phytotax. Sinica **11**: 75. 1966.

叶近圆形,长3.5—6厘米,顶端圆或钝形,基部微心形,边缘有不明显的波状小齿,侧脉5—6对。花序直径约4厘米;花冠浅红色。

特产云南西北部。生于山坡林中,海拔2700—3200米。模式标本采自云南德钦。

4. 绣球荚蒾(新拟) 绣球(广群芳谱),木绣球(拉汉种子植物名称),八仙花、紫阳花(南京)

***Viburnum macrocephalum* Fort. in Journ. Hort. Soc. Lond. **2**: 244. 1847; Lindl. Bot. Reg. **33**: t. 43. 1847; Hao in Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping **1**: 84. 1931.**——*V. macrocephalum* Fort. α . *sterile* Dipp. Handb. Laubh. **1**: 178. 1899; Hao in l. c., ut “var.”——裴鉴等,江苏南部种子植物手册 716. 1959, ut “var.”——*V. keteleeri macrocephalum* Carr. in Rev. Hort. **1863**: 271.

绣球荚蒾(原变型)

Viburnum macrocephalum* Fort. forma *macrocephalum

落叶或半常绿灌木,高达4米;树皮灰褐色或灰白色;芽、幼枝、叶柄及花序均密被灰