

### 16. 三脉叶荚蒾(新拟)

**Viburnum triplinerve** Hand.-Mazz. in *Sinensia* 5: 15. 1934.

常绿灌木,高达2米,全体无毛;幼枝纤细,褐色,有时密生皮孔,老枝灰白色。叶常密集于小枝顶,革质,椭圆形、椭圆状卵形或近圆形,长2—6(—7.5)厘米,约为宽度的二倍,两端钝或圆形,全缘,离基2—6毫米处具3出脉,脉延伸至叶全长的约3/4处,近缘前弯拱而互相网结,上面凹陷,下面显著,小脉上面略凹陷,下面常不明显;叶柄长7—15毫米。聚伞花序直径1.5—3.5厘米,果时可达10厘米,总花梗长约1厘米,纤细,第一级辐射枝6—8条,长4—7毫米,花生于第二级辐射枝上,花梗甚短;萼筒宽钟形,长不到1毫米,萼齿宽三角形或宽卵形,顶钝,长约为萼筒之半或不到;花冠辐状,裂片近圆形,直径约1毫米,长二倍于筒;雄蕊约与花冠等长,花药球形;柱头几无柄,约与萼齿等高。果实近圆形,直径4—5毫米,熟时紫褐色,有1条极细的浅腹沟。

特产广西。生于山地,海拔约550米。模式标本采自广西罗陈。

17. 球核荚蒾(中国高等植物图鉴) 兴山绣球(中国树木分类学),兴山荚蒾(拉汉种子植物名称)

**Viburnum propinquum** Hemsl. in *Journ. Linn. Soc. Bot.* 23: 355. 1888; Chun in *Sunyatsenia* 1: 315. 1934; Kaneh. *Formos. Trees* rev. ed. 702, fig. 659. 1936; H. L. Li, *Woody Fl. Taiwan* 892. 1963, et *Fl. Taiwan* 4: 718. 1978; 中国高等植物图鉴 4: 314, 图 6042. 1975.

### 球核荚蒾(原变种)

**Viburnum propinquum** Hemsl. var. **propinquum**

常绿灌木,高达2米,全体无毛;当年小枝红褐色,光亮,具凸起的小皮孔,二年生小枝变灰色。幼叶带紫色,成长后革质,卵形至卵状披针形或椭圆形至椭圆状矩圆形,长4—9(—11)厘米,顶端渐尖,基部狭窄至近圆形,两侧稍不对称,边缘通常疏生浅锯齿,基部以上两侧各有1—2枚腺体,具离基三出脉,脉延伸至叶中部或中部以上,近缘前互相网结,有时脉腋有集聚簇状毛,中脉和侧脉(有时连同小脉)上面凹陷,下面凸起;叶柄纤细,长1—2厘米。聚伞花序直径4—5厘米,果时可达7厘米,总花梗纤细,长1.5—2.5(—4)厘米,第一级辐射枝通常7条,花生于第三级辐射枝上,有细花梗;萼筒长约0.6毫米,萼齿宽三角状卵形,顶钝,长约0.4毫米;花冠绿白色,辐状,直径约4毫米,内面基部被长毛,裂片宽卵形,顶端圆形,长约1毫米,约与筒等长;雄蕊常稍高出花冠,花药近圆形。果实蓝黑色,有光泽,近圆形或卵圆形,长(3—)5—6毫米,直径3.5—4毫米;核有1条极细的浅腹沟或无沟。

产陕西南部、甘肃南部、浙江南部、江西北部、福建北部、台湾、湖北西部、湖南西北部和西南部、广东北部、广西东北部至西北部、四川东北部至东南部、贵州及云南东北部。生于山谷林中或灌丛中,海拔500—1300米。菲律宾吕宋也有分布。模式标本采自湖北