

集聚簇状毛。花药堇紫色。

产陕西(秦岭)、甘肃南部、湖北西部、四川、贵州东北部和东南部、云南东北部和西北部及广西东北部。生于山谷溪涧旁密林中或林缘,海拔 1400—3500 米。模式标本采自四川康定。

本变种在四川峨眉民间用嫩叶代茶。

22c. **小红荚蒾**(变种)(植物分类学报)

Viburnum erubescens Wall. var. **parvum** Hsu et S. C. Hsu in Acta Phytotax. Sinica **13**(1): 111. 1975.

灌木,高约 1 米;枝及小枝甚粗壮,节间短。叶较小,矩圆状椭圆形,两端楔尖,长 2—3 厘米,中部以上边缘具钝锯齿,侧脉与小脉不明显。花序极小,直径约 1.5 厘米。花密生于序轴的第一级分枝上;花冠白色,较短,筒长约 5 毫米;花药堇紫色。花期 5 月。

特产云南西部。生于山坡杂木林内。模式标本采自漾濞。

23. **瑞丽荚蒾**(拉汉种子植物名称)

Viburnum shweliense W. W. Smith in Notes Bot. Gard. Edinb. **12**: 227. 1920, et ibid. **17**: 316. 1930.

落叶灌木或小乔木,高达 3 米;幼枝无毛,散生灰色圆形大皮孔。叶纸质,宽椭圆形或矩圆状宽椭圆形,长 8—12.5 厘米,顶端钝或有小凸尖,基部近宽楔形,边缘有少数显著的锐锯齿,上面无毛,下面中脉与侧脉被簇状毛,侧脉 6—7 对,稍弧形,直达齿端;叶柄长 2—2.5 厘米,无毛或散生簇状毛。圆锥花序顶生或生于具 1 对叶的短枝之顶,长、宽各约 5 厘米,密被带白色簇状毛,总花梗长 3—4 厘米,被疏柔毛;萼略带红色,萼筒倒圆锥形,长约 3 毫米,萼齿卵形,长常不及 1 毫米,顶钝;花冠乳白色,辐状钟形,筒长约 3 毫米,裂片长 1.5—2 毫米,宽卵形,反曲;雄蕊明显高出花冠筒。果实不详。花期 7 月。

特产云南西部。生于灌丛中,海拔 3000—3300 米。模式标本采自瑞丽与怒江之间的分水岭。

24. **漾濞荚蒾**(植物分类学报) **秦氏荚蒾**(植物分类学报)

Viburnum chingii Hsu in Acta Phytotax. Sinica **11**(1): 68, t. 10, fig. 1. 1966. — *V. erubescens* Wall. var. *neurophyllum* Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 1033. 1936. — *V. chingii* Hsu var. *patentiserratum* Hsu, ibid. 69, t. 10, fig. 2, syn. nov.

漾濞荚蒾(原变种)

Viburnum chingii Hsu var. **chingii**

常绿灌木或小乔木,高达 5 米;当年小枝圆筒状,黄白色,连同叶柄和叶下面脉上初时散生带黄色簇状微柔毛,后变无毛,二年生小枝灰褐色。叶亚革质,椭圆形、卵状椭圆形或倒卵形,至倒卵状矩圆形,长 3.5—9 厘米,顶端短尖或钝形,有时急狭而短尾尖,基部宽楔形或钝形,边缘具钝或尖的锯齿,齿端微凸尖,或为开展的锐锯齿,基部全缘,上面有光泽,