

130—1000 米。模式标本采自湖南城步。

70b. 光萼荚蒾(亚种)(植物分类学报) 图版 20: 8—9

Viburnum formosanum Hayata subsp. **leiogynum** Hsu in Acta Phytotax. Sinica 11(1): 81, t. 15. 1966.

当年小枝和叶柄无毛或被簇状短柔毛,并夹杂简单长毛。叶长可达 11 厘米。花序被簇状短柔毛;总花梗通常长达 2.2 厘米或几无;萼筒无毛。果实扁圆形,顶端急尖,宿存花柱远高出萼齿;核扁,卵圆形,长 5—8 毫米,直径 4—6 毫米,背面微凸尖。花期 5 月,果熟期 8—10 月。

产浙江南部、福建北部、广西(凌云)及四川(南川)。生于山坡沟谷旁林中,海拔 700—1100 米。模式标本采自浙江云和。

71. 宜昌荚蒾(植物分类学报) 野绣球(植物名实图考),糯米条子(湖北宜昌、陕西安康)

Viburnum erosum Thunb. Fl. Jap. 124. 1784; 贾祖璋等,中国植物图鉴 115,图 206. 1937; 陈嵘,中国树木分类学 1154. 1937. — *V. ichangense* Rehd. in Sarg. Trees and Shrubs 2: 150. 1908, pro maj. parte, excl. Henry 1888 et 5271, syn. nov. — *V. matsudai* Hayata, Ic. Pl. Formos. 9: 41, fig. 20. 1920, syn. nov. — *V. villosifolium* Hayata, ibid. 45. e descr.

宜昌荚蒾(原变种) 图版 21

Viburnum erosum Thunb. var. **erosum**

落叶灌木,高达 3 米;当年小枝连同芽、叶柄和花序均密被簇状短毛和简单长柔毛,二年生小枝带灰紫褐色,无毛。叶纸质,形状变化很大,卵状披针形、卵状矩圆形、狭卵形、椭圆形或倒卵形,长 3—11 厘米,顶端尖、渐尖或急渐尖,基部圆形、宽楔形或微心形,边缘有波状小尖齿,上面无毛或疏被叉状或簇状短伏毛,下面密被由簇状毛组成的绒毛,近基部两侧有少数腺体,侧脉 7—10(—14) 对,直达齿端;叶柄长 3—5 毫米,被粗短毛,基部有 2 枚宿存、钻形小托叶。复伞形式聚伞花序生于具 1 对叶的侧生短枝之顶,直径 2—4 厘米,总花梗长 1—2.5 厘米,第一级辐射枝通常 5 条,花生于第二至第三级辐射枝上,常有长梗;萼筒筒状,长约 1.5 毫米,被绒毛状簇状短毛,萼齿卵状三角形,顶钝,具缘毛;花冠白色,辐状,直径约 6 毫米,无毛或近无毛,裂片圆卵形,长约 2 毫米;雄蕊略短于至长于花冠,花药黄白色,近圆形;花柱高出萼齿。果实红色,宽卵圆形,长 6—7(—9) 毫米;核扁,具 3 条浅腹沟和 2 条浅背沟。花期 4—5 月,果熟期 8—10 月。

产陕西南部、山东(崂山)、江苏南部、安徽南部和西部、浙江、江西、福建、台湾、河南、湖北、湖南、广东北部、广西北部、四川、贵州和云南。生于山坡林下或灌丛中,海拔 300—1800(—2300) 米。日本和朝鲜也有分布。种子含油约 40%,供制肥皂和润滑油。茎皮纤维可制绳索及造纸;枝条供编织用。