

约 10 余种,主要分布于东亚和美洲东北部。我国有 2 种,另有庭园栽培者 1—2 种。

模式种: 日本锦带花 *W. japonica* Thunb.

分 种 检 索 表

1. 萼檐裂至中部,萼齿披针形;种子无翅……………1. 锦带花 *W. florida* (Bunge) A. DC.
1. 萼檐裂至基部,萼齿条形;种子多少具翅……………2. 半边月 *W. japonica* var. *sinica* (Rehd.) Bailey

1. 锦带花(秘传花镜) 锦带、海仙(植物名实图考) 图版 34:1—2

Weigela florida (Bunge) A. DC. in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 11: 241. 1839; Bailey in Gent. Herb. 2(1): 52, fig. 21 d, e. 1929; 陈嵘, 中国树木分类学 1167. 1957; 刘慎谔等, 东北木本植物图志 507. 1955; 中国高等植物图鉴 4: 283, 图 5979. 1975. — *Calysphyrum floridum* Bunge, Enum. Pl. Chin. Bor. 33. 1833. — *Diervilla florida* (Bunge) Sieb. et Zucc. Fl. Jap. 1: 75. 1837, pro parte. — *W. pauciflora* A. DC. in l. c.

落叶灌木,高达 1—3 米;幼枝稍四方形,有 2 列短柔毛;树皮灰色。芽顶端尖,具 3—4 对鳞片,常光滑。叶矩圆形、椭圆形至倒卵状椭圆形,长 5—10 厘米,顶端渐尖,基部阔楔形至圆形,边缘有锯齿,上面疏生短柔毛,脉上毛较密,下面密生短柔毛或绒毛,具短柄至无柄。花单生或成聚伞花序生于侧生短枝的叶腋或枝顶;萼筒长圆柱形,疏被柔毛,萼齿长约 1 厘米,不等,深达萼檐中部;花冠紫红色或玫瑰红色,长 3—4 厘米,直径 2 厘米,外面疏生短柔毛,裂片不整齐,开展,内面浅红色;花丝短于花冠,花药黄色;子房上部的腺体黄绿色,花柱细长,柱头 2 裂。果实长 1.5—2.5 厘米,顶有短柄状喙,疏生柔毛;种子无翅。花期 4—6 月。

产黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、山西、陕西、河南、山东北部、江苏北部等地。生于海拔 100—1450 米的杂木林下或山顶灌木丛中。苏联、朝鲜和日本也有分布。

据《东北木本植物图志》记载,我国东北及朝鲜有早锦带花 *W. praecox* (Lemoine) Bailey 分布,认为本种与早锦带花外形极相似,很易混淆,其主要区别为本种叶下面主脉上有密的白色毡毛。早锦带花 (*Diervilla praecox*) 一名最初出现于园艺名录上,为非专门性发表。根据我国东北的大量蜡叶标本观察,枝叶长出后因老嫩不同而毛被也常有差异,实不足为定种的唯一特征依据。

一般常用 *W. hybrida* Hort. 一名来称谓园艺上的杂交种。由于杂交种外形上与本种比较相近,常认为与本种有关,但它们在花的颜色、大小、开花季节和花数的多少方面都有很大变化。其亲本究竟是哪个种? 是否与本种有关? 有待园艺方面作进一步研究。

2. 日本锦带花(中国高等植物图鉴)

Weigela japonica Thunb. in Svenska Vetensk. Akad. Handl. ser. 2, 1: 137 et



1—2. 锦带花 *Weigela florida* (Bunge) A. DC.: 1. 花枝, 2. 萼的纵剖面。3—7. 半边月 *W. japonica* Thunb. var. *sinica* (Rehd.) Bailey: 3. 花枝, 4. 花纵剖面放大, 5. 果实放大, 6. 果横剖面放大, 7. 种子放大。
(张荣生绘)