

**Lonicera dasystyla** Rehd. Syn. *Lonicera* 158. 1903; Danguy in Lecomte, Fl. Gen. Indo-Chine 3: 18. 1922, ut "dasystyle".

藤本；小枝、叶柄和总花梗均密被灰白色微柔毛；幼枝紫红色，老枝茶褐色。叶纸质，卵形或卵状矩圆形，长2—6(—9)厘米，茎下方的叶有时不规则羽状3—5中裂，顶端钝或近圆形，有时具短的钝凸尖，基部圆形、截形或有时微心形，两面无毛或疏生短柔毛和微柔毛，上面有时具紫晕，下面稍粉红色，壮枝的叶下面被灰白色毡毛；叶柄长4—10(—13)毫米，两叶柄相连处呈线状凸起。双花生于小枝稍叶腋，集成总状花序，芳香；总花梗长4—12毫米；苞片极小，三角形，长1—2毫米，远比萼筒短；小苞片圆卵形，极小，疏生微缘毛；萼筒稍有白粉，长2—2.5毫米，萼齿宽三角形、半圆形至卵形，顶端钝或圆；花冠白色，近基部带紫红色，后变淡黄色，长2—3.5厘米，唇形，筒长14—17毫米，外面略被倒生微柔伏毛或无毛，筒内沿上唇方向密生短柔毛，上唇与筒几等长，裂片矩圆状披针形，长约5毫米，两侧裂的裂隙深逾1/3，下唇长条形，比上唇长；雄蕊与花冠几等长，花丝基部有疏柔毛，花药条形；花柱伸出，下方1/3有柔毛或无毛。果实黑色。花期3—4月，果熟期8—10月。

产广东(肇庆鼎湖山)和广西。生于水边灌丛中，海拔300米以下。越南北部也有分布。

本种的花蕾、茎和叶具有清热解毒的作用，花蕾在广西扶绥县作“金银花”收购入药。

80. 忍冬(名医别录) 金银花(本草纲目)，金银藤(江西铅山、云南楚雄)，银藤(浙江临海、江苏)，二色花藤(上海)，二宝藤、右转藤(四川)，子风藤(浙江丽水)，蜜槐藤(江西铅山)，鸳鸯藤(福建)，老翁须(常用中草药图谱)

**Lonicera japonica** Thunb. Fl. Jap. 89. 1784; 中药志 3: 336, 506, 彩图 12. 1960; H. L. Li, Woody Fl. Taiwan 886. 1963; 中国高等植物图鉴 4: 297, 图 6008. 1975; 全国中草药汇编, 上册 540, 图 556. 1975; Lauener et Ferguson in Notes Bot. Gard. Edinb. 32(1): 99. 1972. — *Caprifolium japonicum* Dum. Cour. Bot. Cult. ed. 2, 7: 209. 1814. — *Nintooa japonica* Sweet, Hort. Brit. ed. 2, 258. 1830. — *L. fauriei* Lévl. et Vant. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 5: 100. 1908. — *L. japonica* Thunb. var. *sempervillosa* Hayata, Ic. Pl. Formos. 9: 47. 1920. — *L. shintensis* Hayata, ibid. 48.

忍冬(原变种) 图版 62: 1—4

**Lonicera japonica** Thunb. var. **japonica**

半常绿藤本；幼枝暗红褐色，密被黄褐色、开展的硬直糙毛、腺毛和短柔毛，下部常无毛。叶纸质，卵形至矩圆状卵形，有时卵状披针形，稀圆卵形或倒卵形，极少有1至数个钝缺刻，长3—5(—9.5)厘米，顶端尖或渐尖，少有钝、圆或微凹缺，基部圆或近心形，有糙缘