

时稍弯曲,外面被多少开展的倒糙毛和长、短两种腺毛,内面有柔毛,唇瓣略短于筒;雄蕊和花柱均伸出,比唇瓣稍长,花丝无毛。果实黑色,椭圆形或近圆形,长6—10毫米。花期4—5月,有时9—10月开第二次花,果熟期10月。

产广东、海南和广西。生于丘陵地的山坡、杂木林和灌丛中及平原旷野路旁或河边,海拔最高达800米。越南北部和尼泊尔也有分布。

本种花供药用,为华南地区“金银花”中药材的主要品种,有清热解毒之功效。藤和叶也入药。

同忍冬 *L. japonica* Thunb. 外貌十分相似,但那个种具硕大的叶状苞片,萼筒无毛,小枝密生开展的糙毛,易与本种区别。

华南植物所标本108817(采自广东,采集人和地点不详)极似本种,但叶下面有明显的盘状腺,花冠唇瓣比筒长。我们怀疑它可能是本种同菰腺忍冬 *L. hypoglauca* Miq. 种间杂交的产物。

82. 菰腺忍冬(新拟) 红腺忍冬(中国高等植物图鉴),大银花(湖南新化),大金银花(广西临桂),大叶金银花(江西安福),山银花(广东鼎湖山)

*Lonicera hypoglauca* Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. 2: 270. 1866; Kaneh. Formos. Trees rev. ed. 692, fig. 647. 1936; H. L. Li, Woody. Fl. Taiwan 885. 1963. et Fl. Taiwan 4: 707. 1978; 中国高等植物图鉴 4: 298, 图 6009. 1975; Hara in Ginkgoana no. 5, 93. 1983. — *L. affinis* Hook. et Arn. var. *pubescens* Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 24 (in Mém. Biol. 10: 58): 37. 1878; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 1: 144. 1911. — *L. affinis mollissima* Blume ex Maxim. in l. c. — *Caprifolium hypoglaucum* Otto in O. Ktze. Rev. Gen. Pl. 1: 274. 1891. — *C. mollissimum* Otto in O. Ktze. l. c. — *L. rubropunctata* Hayata, Ic. Pl. Formos. 9: 48. 1920. — *L. affinis* Hook. et Arn. var. *hypoglauca* (Miq.) Rehd. Syn. *Lonicera* 158. 1903.

菰腺忍冬(原亚种) 图版 62: 7—9

*Lonicera hypoglauca* Miq. subsp. *hypoglauca*

落叶藤本;幼枝、叶柄、叶下面和上面中脉及总花梗均密被上端弯曲的淡黄褐色短柔毛,有时还有糙毛。叶纸质,卵形至卵状矩圆形,长6—9(—11.5)厘米,顶端渐尖或尖,基部近圆形或带心形,下面有时粉绿色,有无柄或具极短柄的黄色至桔红色蘑菇形腺;叶柄长5—12毫米。双花单生至多朵集生于侧生短枝上,或于小枝顶集成总状,总花梗比叶柄短或有时较长;苞片条状披针形,与萼筒几等长,外面有短糙毛和缘毛;小苞片圆卵形或卵形,顶端钝,很少卵状披针形而顶渐尖,长约为萼筒的1/3,有缘毛;萼筒无毛或有时略有毛,萼齿三角状披针形,长为萼筒的1/2—2/3,有缘毛;花冠白色,有时有淡红晕,后变黄色,长3.5—4厘米,唇形,筒比唇瓣稍长,外面疏生倒微伏毛,并常具无柄或有短柄的