

Trev. 相同。民间常以嫩苗作蔬菜食用,也作猪饲料用。

8b. **斑叶败酱**(亚种) 图版 6: 8

subsp. **punctifolia** H. J. Wang, 植物分类学报 **23**(5): 380, 1985.

本亚种与攀倒甑(原亚种)的主要区别在于通常无地下根茎,叶片上面具棕红色微腺;花序最下分枝处的总苞叶常有 1(—2) 对侧裂片,果实能育子室上部两侧和边缘被微糙毛或有时无毛。与斑花败酱 *P. Punctiflora* Hsu et H. J. Wang 的叶片上面均具微腺,但后者的花淡黄色且较小,花冠具微腺,花序最下分枝总苞叶不分裂,而易于区别。

产吉林南部以及辽宁东部、东南部和南部。生于海拔 800 米以下的山坡草丛中、灌丛中、林缘或路旁。模式标本采自辽宁桓仁。

9. **斑花败酱**(植物分类学报) 细样苦斋(广西桂林),马竹霄(江西安福),无心草(浙江德清)

Patrinia punctiflora Hsu et H. J. Wang, 植物分类学报 **11**(2): 203, 图版 31, 1966.

9a. **斑花败酱**(原变种) 图版 7: 1—6

var. **punctiflora**

二年生或多年生草本,高 45—150(—200) 厘米;常无匍匐根茎,主根系粗壮。茎密被倒生粗伏毛,上部毛常排成两纵列,周围有疏粗毛。单叶对生,纸质,卵形、椭圆形、卵状披针形或长圆状披针形,长 2.5—7(—8) 厘米,宽 1—5 厘米,不分裂或稀基部具 1 片或 1—2 对耳状小裂片,先端钝或渐尖,基部楔形下延,边缘具不整齐粗钝齿或浅齿,两面有棕褐色微腺,至疏生糙伏毛;基生叶花时枯萎,叶柄长 6 厘米,茎上部逐渐缩短至无柄。聚伞花序组成顶生疏散伞房花序,具 5—6 级分枝,被白色倒生粗糙毛;苞叶卵形、长圆形、线状披针形或线形,长 1—7 厘米,宽 0.3—3 厘米,具钝齿或全缘,疏被糙毛或几无毛。花梗极短,其下贴生 1 卵形小苞片;萼齿 5,钝齿状或微波状,长 0.2—0.3 毫米;花冠钟状,淡黄色,稀在同一花序中有淡黄色和白色花,裂片稍不等形,卵形、卵状长圆形、卵状披针形或长圆形,长 1.1—1.5 毫米,宽 0.7—1(—1.5) 毫米,其中具蜜囊的一裂片较大,花冠筒较裂片稍短或近等长,内面有白色柔毛,在具蜜囊的一侧呈浅囊状;雄蕊 4,二强,伸出,较短的一对着生于远离蜜囊两侧的冠筒基部,无毛,较长的一对着生于冠筒基部蜜囊之下,基部被开展的白色柔毛,花药长圆形,丁字状着生,花粉粒圆形或钝三角形,具短刺状突起;子房长 0.6—0.8 毫米,宽 0.7—1 毫米,无毛,3 室,2 不育子室肥厚,呈倒卵状突起,能育子室扁椭圆形,位于前者之下面;柱头截头状,稀盾头状。瘦果倒卵状椭圆形,长 1.6—2 毫米,宽 1.1—1.3 毫米,不育子室呈倒卵状凸起,长 1.3—1.7 毫米,宽 0.8—1.2 毫米;种子扁椭圆形,长 1.1 毫米,宽 0.8 毫米。翅状果苞干膜质,卵形或阔卵形,长 3.3—3.8(—4) 毫米,宽 3.3—3.4 毫米,先端钝圆,基部圆形或截形,有主脉 2 条,网状脉明显。花期 7—10 月,果期 8—10 月。