

状线形。聚伞花序头状，顶生，花后主轴及侧轴常明显伸长，使聚伞花序成总状排列。总苞片披针形，长0.5—2厘米，宽0.2—0.4厘米，苞片和小苞片常为披针状卵形或宽卵形。花萼小，5裂，裂片半圆形，无毛，全缘，厚，脉不明显。花冠紫红色，钟形，长7—11毫米，筒外微被毛，基部偏突；花冠裂片5，宽卵形，前端钝圆，长3—4.5毫米，宽2—4毫米；花冠筒喉部具长髯毛；雄蕊4，伸出花冠裂片外，花丝具柔毛；子房下位，花柱与雄蕊近等长，柱头头状。瘦果倒卵形，长约3毫米，无毛；宿萼不等5裂，裂片半圆形至宽三角形，长0.8—1.2毫米，光滑无毛。

产青海南部和四川北部。生于沼泽草甸、河漫滩和灌丛草坡，海拔3200—4050米。模式标本采自四川贡嘎山。

### 3. 缬草属——*Valeriana* Linn.

Linn., Sp. Pl. 31. 1753; Linn., Gen Pl. ed. 5. 19. no. 43. 1754;  
Benth. et Hook. f., Gen. Pl. 2: 154. 1876; F. Hock in Engl. u. Pr.,  
Nat. Pflanzenf. 4(4): 177. 1897; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob.  
9: 167-181. 1934.

多年生草本；根或根状茎常有浓烈气味。叶对生，羽状分裂或少为不裂。聚伞花序，形式种种，花后多少扩展；花两性，有时杂性；花萼裂片在花时向内卷曲，不显著；花小，白或粉红色，花冠筒基部一侧偏突成囊距状，花冠裂片5枚；雄蕊3，着生花冠筒上；子房下位，3室，但仅1室发育而有胚珠1枚。果为1扁平瘦果，前面3脉、后面1脉、顶端有冠毛状宿存花萼。

属选模式种：*V. pyrenaica* Linn.

本属约有200余种，分布于欧亚大陆、南美和北美中部。我国产17种2变种。

一些种类供药用和香料用。

### 分种检索表

1. 根茎块茎状..... 1. **蜘蛛香** *V. jatamansi* Jones
1. 根茎其它形状。
  2. 花序在开花后向上延伸，果序长而疏展。
    3. 植株较粗壮，根茎短缩呈块柱状；在成熟的植株上，果序长可达50—70厘米；花冠白色；果常具毛..... 2. **长序缬草** *V. hardwickii* Wall.
    3. 植株较柔细，根茎细柱状，具明显的环节；花冠红色；果常光秃..... 3. **柔垂缬草** *V. flaccidissima* Maxim.
  2. 花序开花后向四周疏展。
    4. 高大草本，高常在80厘米以上；根茎粗短呈头状，带状须根簇生；叶羽状分裂，裂片形状，大小变异极大。
      5. 茎被粗毛，但不具腺毛..... 4. **缬草** *V. officinalis* Linn.

5. 茎上部及花序具有柄的腺毛 ..... 5. **黑水缬草** *V. amurensis* Smir. ex Kom.
4. 植株较矮小或为纤细小草本, 高一般不超过 40 厘米。
6. 羽裂叶之侧裂片, 通常 5 对以上, 并为椭圆形 ..... 6. **高山缬草** *V. kawakamii* Hayata
6. 羽裂叶的侧裂片在 5 对以下, 若在 5 对以上, 常为线形或长圆形。
7. 花冠筒狭长, 向上几不扩展, 其长度常为花冠裂片的 4—5 倍 .....  
..... 7. **瑞香缬草** *V. daphniflora* Hand.-Mazz.
7. 花冠筒长不超过裂片的 3 倍。
8. 茎生叶羽状分裂, 顶端裂片与侧裂片近同形同大小。
9. 开花时基生叶和茎下部叶常脱落, 植株下部留有一段延长而无叶的茎 .....  
..... 8. **夏河缬草** *V. xiaheensis* L. C. Chiu
9. 开花时植株下部不具延长而无叶的茎。
10. 叶裂片线形至狭披针形, 长 1.2—2 厘米, 宽 1—2 毫米; 花淡红色, 两性 .....  
..... 9. **窄裂缬草** *V. stenoptera* Diels
10. 叶裂片长圆形, 长 4—6 毫米, 宽 1.5—2 毫米; 花白色, 杂性 .....  
..... 10. **秀丽缬草** *V. vennata* L. C. Chiu
8. 茎生叶羽状分裂, 顶裂片比侧裂片为大。
11. 羽裂片 3 出或最多为 5 裂, 有时为单叶。
12. 花序呈密花头状, 径 1—1.5 厘米; 小苞片钝头 ..... 11. **髯毛缬草** *V. barbulata* Diels
12. 花序为伞房状聚伞花序; 小苞片常锐尖 ..... 12. **小花缬草** *V. minutiflora* Hand.-Mazz.
11. 羽裂片的裂片常在 5 枚以上。
13. 茎生叶裂片不裂至中肋, 茎基部不被膜质或纤维状老叶鞘 .....  
..... 13. **毛果缬草** *V. hirticalyx* L. C. Chiu
13. 茎生叶羽裂深达中肋, 呈复叶状, 茎基部被纤维状老叶鞘或无。
14. 根状茎明显, 长 1—2 厘米, 茎基部稍被膜状老叶鞘, 由根茎长出细须状根 .....  
..... 14. **北疆缬草** *V. turezaninovii* Grub.
14. 根状茎不明显, 茎基部密被膜状至纤维状老叶鞘或无。
15. 根须状或细带状。
16. 植株较矮小, 高 10 厘米左右; 叶裂片全缘 ..... 15. **小缬草** *V. tangutica* Bat.
16. 植株高 15—25 厘米; 叶裂片边缘具疏齿 .....  
..... 16. **新疆缬草** *V. fedtshenkoi* Coincy
15. 根粗带状; 茎基部不密被纤维状老叶鞘; 对生的宽而膜质的叶柄, 相连合而成长筒状叶鞘, 抱茎 ..... 17. **芥叶缬草** *V. sisymbriifolia* Vahl

**1. 蜘蛛香(本草纲目拾遗) 马蹄香(中国经济植物志), 大救驾(陕西、四川), 老君须(陕西) 图版 10: 1**

***Valeriana jatamansi*** Jones in As. Res. **2**: 405, 416. 1790; Hand.-Mazz. in Acta Hort. Gothob. **9**: 171. 1934; Merr. in Journ. Arn. Arb. **23**: 196. 1942; 中国高等植物图鉴 **4**: 334, 图 6082. 1975. — *V. wallichii* DC., Prodr. **4**: 623—642. 1830. — *V. harmsii* Graebn., in Bot. Jahrb. **24**(59): 33. 1898. — *V. mairei* Briq. in Ann. Cons. Bot. Gen. **17**: 330. 1914. — *V. jatamansi* Jones var. *frondosa* Hand.-Mazz., l. c. — *V. jatamansi* Jones var.