

边缘稍拱起。花期4—8月,果期8—11月。

产四川、贵州、云南、广西、广东、福建、江西。常生于海拔500—1000米的林边或山坡路旁潮湿处。印度半岛、中南半岛、苏门答腊、菲律宾和日本也有。

5. 台湾马陵儿(中国高等植物图鉴) 称铤子(广东)

Zehneria mucronata (Bl.) Miq., Fl., Ind. Bot. **1**(1): 656. 1855; C. Jeffrey in Kew Bull. **15**(3):367. 1962. — *Bryonia mucronata* Bl., Bidj. 923. 1826. — *Melothria mucronata* (Bl.) Cogn. in DC., Mon. Phan **3**: 608. 1881, et in Engl., Pflanzenr. **66**(IV. 275. 1): 108. 1916. p. p.; 中国高等植物图鉴 **4**: 357, 图 6128. 1975. — *Zehneria kelungensis* Hayata, Ic. Pl. Formosa **10**: 13. f. 7-8. 1921. — *Melothria kelungensis* (Hayata) Hayata ex Mak. et Nemoto, Fl. Jap., ed. **2**: 1161. 1931. — *M. liukiensis* Nakai in Journ. Jap. Bot. **14**:129. 1938. — *Zehneria liukiensis* (Nakai) C. Jeffrey ex E. H. Walk. in Journ. Jap. Bot. **46**: 72. 1971. — *Z. maysorensis* auct. non (Wight et Arn.) Arn.: Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **23**:318. 1887. — *Z. perpusilla* auct. non (Bl.) Cogn.: Kitam., Act. Phytotax. Geobot. **5**: 211. 1936.

草质藤本;茎、枝细,伸长,有棱沟,全体几乎无毛或稀仅在茎、枝上有短柔毛。卷须丝状,不分歧;叶柄细,长1.5—5厘米。叶片膜质,宽卵形,长、宽均4—8厘米,上面深绿色,有疣状小点,背面苍绿色,先端急尖,有短尖头或短渐尖,基部弯缺半圆形,极稀戟形,深0.5—1(—2)厘米,不分裂或有3—5个角,边缘有不规则的波状齿,脉掌状。雌雄异株。雄花:10—30朵花生于总梗顶端呈伞房状花序,花序轴细弱,长1.5—5厘米;花梗开展,丝状,长3—6毫米;花萼筒宽钟状,基部急尖,径约3毫米,裂片钻形,外弯,长0.5毫米;花冠淡黄色,有短柔毛,裂片卵形,急尖,长2.5毫米,具3脉;雄蕊3枚,花丝短,长约1毫米,有短柔毛,花药卵形,长0.8—1毫米。雌花:单生或有时几朵簇生,稀呈伞房状花序;花梗长1—1.5厘米;子房长圆形。果实浆果状,卵状长圆形,两端钝,平滑无毛,长1—1.5厘米,径7—10毫米。种子灰白色,卵状长圆形,基部稍渐狭,边缘稍拱起,长2—3毫米,宽约2毫米。花果期3—12月。

产云南、广东和台湾。生于海拔800—1400米的林边或丛林中。分布于亚洲热带地区。

12. 帽儿瓜属——*Mukia* Arn.

Arn., Madras Journ. Lit. Sc. **12**: 50. 1840; Hook. in Journ. Bot. **3**: 276. 1841; C. Jeffrey in Kew Bull. **15**: 343. 1962; Hutch., Gen. Fl. Pl. **2**: 393. 1967. — *Melothria* Sect. *Mukia* Cogn. in DC., Mon. Phan. **3**: 622. 1881; Müller et Pax in Engl. u. Pr., Pflanzenf. IV. **5**: 15. 1889; Cogn., in Engl., Pflanzenr. **66**(IV. 275. 1): 125. 1916.