

2. 藏南金钱豹(新拟) 图版 11: 5

Campanumoea inflata (Hook. f.) C. B. Cl. in Hook. f., Fl. Brit. Ind. 3: 436. 1881.——*Codonopsis inflata* Hook. f., Ill. Himal. Pl. t. 16, c. 1855; Hook. f. et Thoms., Journ. Linn. Soc. Bot. 2: 13. 1858.

草质缠绕藤本。根稍加粗,有分枝。茎几乎无毛。叶互生,具3—6厘米长的叶柄,叶片卵形至卵状披针形,基部深心形,顶端渐尖,边缘波状或全缘,长4—10厘米,宽2—5.5厘米,上面无毛或疏生短毛,下面灰色,被细柔毛。花单朵,几乎与叶对生,或在枝顶组成少花的单歧聚伞花序,花梗长2—3厘米。花萼贴生至子房顶端,裂片与花冠着生处同一位置,筒部倒三角状圆锥形,被细柔毛,裂片卵状三角形,边缘常翻卷,长约1厘米;花冠钟状,淡黄色或浅绿色,边缘及脉上常紫色,长2.5—3厘米,分裂深度为1/3;雄蕊5枚,花丝无毛,花柱无毛,柱头3裂;子房3室。浆果球状,直径12—15毫米,黄绿色(?)。种子卵圆状,有网状纹饰。8—9月开花。

产我国西藏南部(墨脱)。我国系新记录。生于海拔2500米以下的阔叶林下或林缘草地中。锡金、不丹也有。模式标本采自锡金。

本种花萼贴生至子房顶端,叶互生,花与叶对生,或在枝顶成少花的单歧聚伞花序,与金钱豹易于区别。

组2. 轮钟草组——Sect. *Cyclocodon* (Griff.) C. B. Cl. in Hook. f., Fl. Brit. Ind. 3: 436. 1881; 吴征镒和李锡文,云南热带亚热带植物区系研究报告,第一集: 77. 1965.——gen. *Cyclocodon* Griff. Not. Pl. As. 4: 279. 1854.

直立草本。花萼裂片条形或条状披针形,边缘有齿,极少全缘的。3种。

3. 长叶轮钟草(云南热带亚热带植物区系研究报告) 肉算盘,山荸荠

Campanumoea lancifolia (Roxb.) Merr., Enum. Philip. Pl. 3: 587. 1923; Tsoong, Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping, 3(3): 111. 1935; 吴征镒和李锡文,云南热带亚热带植物区系研究报告,第一集: 77—78. 1965; 中国高等植物图鉴, 4: 384. 图 6181. 1975.——*C. axillaris* Oliv., Hook. Icon. Pl. 3: 8, t. 1775. 1888.——*C. celebica* auct. non Roxb.; Danguy in Lecte, Fl. Gén. Indo-Chin. 3: 693, fig. 78, 5—8. 1930, p. p. maj.——*Campanula lancifolia* Roxb., Fl. Ind. 1: 505. 1820; A. DC., in DC. Prodr. 7: 485. 1839.——*Codonopsis lancifolia* (Roxb.) Moliono in Fl. Males. ser. 1. 6: 120. 1960.——*Codonopsis truncata* Wall., Cat. 1301. 1829, nom. nud.; A. DC., Monogr. Camp. 120. 1830.——*Campanumoea truncata* (Wall.) Diels, Bot. Jahrb. Engler 29: 606. 1901.——*Cyclocodon truncatum* (Wall.) Hook. f. et Thoms., Journ. Linn. Soc. Bot. 2: 18. 1858.——*Codonopsis albiflora* Griff., Not. Pl. As. 4: 279. 1854.——*Cyclocodon adnatus*



1—3. 西藏党参 *Codonopsis xizangensis* Hong: 1. 植株, 2. 叶的背面, 3. 一朵花。 4. 小叶轮
钟花 *Campanumoea celebica* Bl.。 5. 藏南金钱豹 *Campanumoea inflata* (Hook. f.) C.
B. Cl. (王金凤绘)