

产于云南东南部(屏边、西畴)、广西(南宁、那坡、上思)。印度、尼泊尔、斯里兰卡、越南、老挝、泰国、印度尼西亚及马来西亚也有分布。生于山谷、山坡或疏林中, 海拔 800—1200 米。

3. 茄叶斑鸠菊 斑鸠菊(广西) 大过山龙(海南) 咸虾花 斑鸠木(广西) 茄叶咸虾花 图版 1: 8—14


Vernonia solanifolia Benth. in Hook., Lond. Journ. Bot. 1: 486. 1842. et Fl. Hongk. 169. 1861; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 402. 1888; Merr. in Lingn. Journ. Sc. 5: 182. 1927; Hand.-Mazz. in Beih. Bot. Centralbl. 56 (B): 467. 1937; Chang in Sunyats. 3: 272. 1937; 广东植物研究所, 海南植物志 3: 373, 图 779, 1974; 中国高等植物图鉴 4: 405. 图 6224. 1974.——*V. fortunei* Sch.-Bip. in Flora 35: 48. 1852.

直立灌木或小乔木, 高 8—12 米, 枝开展或有时援攀, 圆柱形, 被黄褐色或淡黄色密绒毛。叶具柄, 卵形或卵状长圆形, 长 6—16 厘米, 宽 4—9 厘米, 顶端钝或短尖, 基部圆形或近心形, 或有时截形, 多少不等侧, 全缘, 浅波状或具疏钝齿, 侧脉 7—9 对, 细脉稍平行, 网状, 上面粗糙, 被疏贴生硬短毛, 后多少脱落, 有腺点, 下面被淡黄色密绒毛, 叶柄粗壮, 长 1—2.5 厘米, 被密绒毛。头状花序小, 径 5—6 毫米, 多数, 在茎枝顶端排列成具叶宽达 20 厘米的复伞房花序, 花序梗长 4—6 毫米, 密被绒毛; 总苞半球形, 宽 4—5 毫米, 总苞片 4—5 层, 卵形, 椭圆形或长圆形, 长 2—6 毫米, 顶端极钝, 背面被淡黄色短绒毛; 花托平, 具小窝孔; 花约 10 个, 有香气, 花冠管状, 粉红色或淡紫色, 长约 6 毫米, 管部细, 檐部狭钟状, 具 5 个线状披针形裂片, 外面有腺, 顶端常有白色短微毛; 瘦果 4—5 棱, 长 2—2.5 毫米, 稍扁压, 无毛; 冠毛淡黄色, 2 层, 外层极短, 内层糙毛状, 长约 8 毫米。花期 11 月至翌年 4 月。

分布于广东(英德、翁源、云浮、大埔、信宜、新兴、高要、海南岛等)、广西(横县、扶绥、上思、昭平等)、福建(福州、漳平、南靖)、云南(河口、西畴、麻栗坡、西双版纳、景洪)。印度、缅甸、越南、老挝、柬埔寨也有。常生于山谷疏林中, 或攀援于乔木上, 海拔 500—1000 米。全草入药, 治腹痛、肠炎、痧气等症。

4. 大叶斑鸠菊 大叶鸡菊花(云南) 图版 4: 1—8

Vernonia volkameriifolia (Wall.) DC., Prodr. 5: 32. 1836; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 39: 503. 1911; Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 1085. 1936; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 18: 251. 1937; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiw. Mus. 22, 1—2: 23. 1969; 中国高等植物图鉴 4: 405. 图 6224. 1975.——*Conyza volkameriaefolia* Wall., Cat. 3001. 1831. nom. nud.——*Eupatorium volkameriaefolium* Wall. ex DC. l. c. in syn.——*Vernonia esquirolii* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 11: 304. 1912, et Fl. Kouy-Tchéou 109. 1914. non Vaniot 1907.



1—7. 都丽菊 *Ethulia conyzoides* L.: 1, 2. 植株; 3, 4, 5. 外、中、内层总苞片; 6. 两性花; 7. 瘦果。
 8—14. 茄叶斑鸠菊 *Vernonia solanifolia* Benth.: 8. 花枝; 9, 10, 11. 外、中、内层总苞片; 12. 两性花;
 13. 冠毛一根; 14. 瘦果。(王金凤绘)