

17. 雏菊属——*Bellis* L.

L., Sp. Pl. 886. 1753; et Gen. Pl. ed. 5. 378. 1754; Benth. et Hook. f., Gen. Pl. 2: 265. 1873; O. Hoffm. in Engler et Prant., Pflanzenf. IV. 5: 156. 1890.

多年生或一年生草本，葶状丛生或茎分枝而疏生。叶基生或互生，全缘或有波状齿。头状花序常单生，有异型花，放射状，外围有1层雌花，中央有多数两性花，都结果实。总苞半球形或宽钟形；总苞片近2层，稍不等长，草质。花托凸起或圆锥形，无托片。雌花舌状，舌片白色或浅红色，开展，全缘；花柱分枝短扁，三角形。瘦果扁，有边脉，两面无脉或有1脉。冠毛不存在或有连合成环且与花冠管部或瘦果合生的微毛。

约有7种，分布于北半球许多地区。我国有1习见栽培种。

1. 雏菊 延命菊 马兰头花

Bellis perennis L., Sp. Pl. ed. 1, 886. 1753; Hegi, Ill. Fl. Mitt-Eur. 4: 414. f. 214, e-h, 215, t. 260, f. 4.; 江苏南部种子植物手册 747. 1959; 中国高等植物图鉴 4: 417. 图 6247. 1975.

多年生或一年生葶状草本，高10厘米左右。叶基生，匙形，顶端圆钝，基部渐狭成柄，上半部边缘有疏钝齿或波状齿。头状花序单生，直径2.5—3.5厘米，花葶被毛；总苞半球形或宽钟形；总苞片近2层，稍不等长，长椭圆形，顶端钝，外面被柔毛。舌状花一层，雌性，舌片白色带粉红色，开展，全缘或有2—3齿；管状花多数，两性，均能结实。瘦果倒卵形，扁平，有边脉，被细毛，无冠毛。

原产欧洲。现在我国各地庭园栽培为花坛观赏植物。

18. 刺冠菊属——*Calotis* R. Brown

R. Brown, Bot. Reg. 6: t. 504. 1820; Benth. et Hook. f., Gen. Pl. 2: 267. 1873; O. Hoffm., Engler et Prant., Pflanzenf. IV. 5: 160. 1890.

多年生或一年生丛生草本，叶互生，全缘、有齿或羽状裂片。头状花序小，有异型花，放射状，外围有1层结果实的雌花，中央常有不育的两性花，有花序梗。总苞半球形或宽钟形；总苞片近3层，宽或狭，稍不等长，边缘干膜质。花托平或凸起，无托片。雌花舌状，全缘，白色，有时蓝色或紫色；两性花管状，檐部稍宽，有5裂片；花药基部钝，全缘；花柱分枝狭或近条形，附片短而钝。雌花瘦果扁，倒卵圆形或矩圆形。冠毛毛状或有2至多数芒，具短髯，短或1至多数而花后增长，开展，刺状，有时另有2至多数钝膜片。

约20种，主产于大洋洲，2种分布于东南亚。我国海南岛产1种。

1. 刺冠菊 图版 28: 1—5