

期5—9月。

我国南北各省区均有分布。原产北美洲,现在各地广泛分布。常生长于旷野、荒地、田边和路旁,为一种常见的杂草。

嫩茎、叶可作猪饲料;全草入药消炎止血、祛风湿,治血尿、水肿、肝炎、胆囊炎、小儿头疮等症。据国外文献记载,北美洲用作治痢疾、腹泻、创伤以及驱蝇虫;中部欧洲,常用新鲜的植株作止血药,但其液汁和捣碎的叶有刺激皮肤的作用。

9. 苏门白酒草 图版 88: 1—4

Conyza sumatrensis (Retz.) Walker in Journ. Jap. Bot. 46 (3): 72. 1971.
—*Erigeron sumatrensis* Retz., Obs. Bot. 5: 28. 1789.

一年生或二年生草本,根纺锤状,直或弯,具纤维状根。茎粗壮,直立,高80—150厘米,基部径4—6毫米,具条棱,绿色或下部红紫色,中部或中部以上有长分枝,被较密灰白色上弯糙短毛,杂有开展的疏柔毛。叶密集,基部叶花期凋落,下部叶倒披针形或披针形,长6—10厘米,宽1—3厘米,顶端尖或渐尖,基部渐狭成柄,边缘上部每边常有4—8个粗齿,基部全缘,中部和上部叶渐小,狭披针形或近线形,具齿或全缘,两面特别下面被密糙短毛。头状花序多数,径5—8毫米,在茎枝端排列成大而长的圆锥花序;花序梗长3—5毫米;总苞卵状短圆柱状,长4毫米,宽3—4毫米,总苞片3层,灰绿色,线状披针形或线形,顶端渐尖,背面被糙短毛,外层稍短或短于内层之半,内层长约4毫米,边缘干膜质;花托稍平,具明显小窝孔,径2—2.5毫米;雌花多层,长4—4.5毫米,管部细长,舌片淡黄色或淡紫色,极短细,丝状,顶端具2细裂;两性花6—11个,花冠淡黄色,长约4毫米,檐部狭漏斗形,上端具5齿裂,管部上部被疏微毛;瘦果线状披针形,长1.2—1.5毫米,扁压,被贴微毛;冠毛1层,初时白色,后变黄褐色。花期5—10月。

产于云南、贵州、广西、广东(包括海南)、江西、福建、台湾。原产南美洲,现在热带和亚热带地区广泛分布。常生于山坡草地、旷野、路旁,是一种常见的杂草。

10. 香丝草 野塘蒿 野地黄菊 蓑衣草(广西) 图版 88: 5—9

Conyza bonariensis (L.) Cronq. in Bull. Torrey Bot. Club. 70: 632. 1943.
—*Erigeron bonariensis* L., Sp. Pl. ed. 1, 2: 863. 1753; Loes. in Gilg. et Loes., Bot. Jahr. 34: (Beibl. 75): 71. 1904. —*Erigeron crispus* Pourr. in Mem. Acad. Sci. Toulouse 3: 318. 1788; Chang in Sunyats. 3: 283. 1937; Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 1904. 1936; 海南植物志 3: 385, 图 789 1974. —*Erigeron sumatrensis* auct., non Retz.; Merr. in Sunyats. 1: 41. t. 17. 1930. —*Erigeron linifolius* Willd., Sp. Pl. 3: 1955. 1803; Benth., Fl. Hongk. 176. 1861; Ling in Contrib. Inst. Bot. Nat. Acad. Peip. 2: 472. 1934; 裴鉴等, 江苏南部种子植物手册, 755. 1959. —*Conyza leucodasys* Miq. in Journ. Bot. Neerl. 1: 103. 1861.

一年生或二年生草本,根纺锤状,常斜升,具纤维状根。茎直立或斜升,高20—50厘米



1—4. 苏门白酒草 *Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker: 1. 植株; 2. 下部叶; 3. 雌花; 4. 两性花。
 5—9. 香丝草 *Conyza bonariensis* (L.) Cronq.: 5. 植株; 6. 下部叶; 7. 头状花序; 8. 雌花; 9. 两性花。
 (王金凤绘)