

Gnaphalium luteo-album L. var. *multiceps* Hook. f., Fl. Brit. Ind. 3: 288. 1881; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 3: 556. 1924. — *Gnaphalium luteo-album* L. ssp. *affine* (D. Don) Koster in Blumea 4: 484. 1941.

一年生草本。茎直立或基部发出的枝下部斜升，高10—40厘米或更高，基部径约3毫米，上部不分枝，有沟纹，被白色厚棉毛，节间长8—20毫米，上部节间罕有达5厘米。叶无柄，匙状倒披针形或倒卵状匙形，长5—7厘米，宽11—14毫米，上部叶长15—20毫米，宽2—5毫米，基部渐狭，稍下延，顶端圆，具刺尖头，两面被白色棉毛，上面常较薄，叶脉1条，在下面不明显。头状花序较多或较少，径2—3毫米，近无柄，在枝顶密集成伞房花序，花黄色至淡黄色；总苞钟形，径约2—3毫米；总苞片2—3层，金黄色或柠檬黄色，膜质，有光泽，外层倒卵形或匙状倒卵形，背面基部被棉毛，顶端圆，基部渐狭，长约2毫米，内层长匙形，背面通常无毛，顶端钝，长2.5—3毫米；花托中央稍凹入，无毛。雌花多数，花冠细管状，长约2毫米，花冠顶端扩大，3齿裂，裂片无毛。两性花较少，管状，长约3毫米，向上渐扩大，檐部5浅裂，裂片三角状渐尖，无毛。瘦果倒卵形或倒卵状圆柱形，长约0.5毫米，有乳头状突起。冠毛粗糙，污白色，易脱落，长约1.5毫米，基部联合成2束。花期1—4月，8—11月。

产我国台湾、华东、华南、华中、华北、西北及西南各省区。生于低海拔干地或湿润草地上，尤以稻田最常见。也分布于日本、朝鲜、菲律宾、印度尼西亚、中南半岛及印度。

茎叶入药，为镇咳、祛痰、治气喘和支气管炎以及非传染性溃疡、创伤之寻常用药，内服还有降血压疗效。

5. 秋鼠麴草(种子植物名称补编)

Gnaphalium hypoleucum DC. in Wight, Contr. Bot. Ind. 21. 1843, et Prodr. 6: 222. 1837; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 426. 1888; Hayata, Ic. Pl. Formos. 8: 58. 1919; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 3: 556. 1924; Merr. in Lingn. Sci. Journ. 5: 184. 1927; Ling in Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping 2: 486. 1934; Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 1105. 1936; Chang in Sunyats. 3: 290. 1937; Kitam. in Mem. Coll. Sci. Kyoto Univ. ser. B. 13: 218. 1937; 中国高等植物图鉴 4: 475. 图 6364. 1975. — *Gnaphalium confertum* Benth. in Lond. Journ. Bot. 1: 488. 1842, et Fl. Hongk. 187. 1861.

5a. 秋鼠麴草(原变种)