

本变型与原变型 *S. pubescens* f. *pubescens* Makino 十分相似,区别在于该变型花梗不具紫褐色头状具柄的腺毛。分布范围与种同。

72. 沼菊属——*Enydra* Lour.

Lour., Fl. Cochinch. 510. 1790; Benth. et Hook. f., Gen.

Pl. 2: 360. 1837.——*Meyera* Schreb., Gen. Pl. 570. 1791.

沼生草本,无毛或被短粗糙毛。叶对生,无柄,全缘或有锯齿。头状花序少数,中等大,近无柄,单生,顶生或腋生,各有多数异型小花,近放射状,外缘雌花多层,结实,中央两性花较少数,结实或内面的有时不结实。总苞片4个,叶状,外面的较大。花托凸起或圆锥状;托片包裹小花,顶端被腺状疏柔毛。雌花花冠舌状,舌片小,顶端3—4裂;两性花花冠管状,檐部钟状,5裂或稀有多于5裂;雄蕊5个,花药基部钝,全缘或有不明显的短耳;两性花花柱分枝顶端钝而被毛。瘦果长圆形,隐藏于坚硬的托片中,外面的背部压扁,中央的两侧压扁,平滑无毛,无冠毛。

约10种,分布热带和亚热带,我国仅1种,产于南部。

1. 沼菊(中国种子植物科属辞典) 图版57: 1—3

Enydra fluctuans Lour., Fl. Cochinch. 511. 1790; DC., Prodr. 5: 637. 1836; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 3: 563. 1924; Merr. in Lingn. Sci. Journ. 5: 184. 1927; Chang in Sunyats. 3: 292. 1937; 海南植物志 3: 403. 图806, 1974; 中国高等植物图鉴 4: 490. 图6394, 1975.——*Meyera fluctuans* (Lour.) Spreng., Syst. 3: 602. 1826.

沼生草本。茎粗壮,圆柱形,稍带肉质,下部匍匐,长40—80厘米,基部径约5毫米,分枝,无毛或稍被柔毛,节间长4—7厘米。叶近无柄,长椭圆形至线状长圆形,长2—6厘米,宽4—14毫米,基部骤狭,抱茎,顶端钝或近短尖,边缘有疏锯齿,两面无毛或有时具疏散的泡状小突点,中脉在上面平,下面明显凸起,侧脉6—8对,细弱,网脉不明显。头状花序少数,径8—10毫米,单生,腋生或顶生;总苞片4个,交互对生,具7条脉,并有明显网脉,背面无毛,外面1对较大,绿色,阔卵形,长约13毫米,顶端钝,内面1对卵状长圆形,长10—11毫米,顶端圆;花托稍凸,径约3毫米,托片坚硬,长约5毫米,背面具3棱,基部近截平,顶端有规则的齿刻,被疏毛。舌状花长约3毫米,舌片顶端3—4裂。管状花与舌状花等长,上半部扩大,檐部有5深裂或齿刻,裂片顶端稍钝,或多裂而齿裂较浅或细齿状;雄蕊5个,稀6个。瘦果倒卵状圆柱形,具明显的纵棱,长约3.5毫米,隐藏于坚硬的托片中。无冠毛。花期11月至翌年4