

月。

产广东南部(海南)至云南西部。生于湿地或溪流边。印度、泰国、中南半岛、马来西亚、印度尼西亚及澳大利亚也有分布。

73. 鳢肠属——*Eclipta* L.

L., Mant. 2: 157. 1771; Less., Syn. Comp. 212. 1832;
DC., Prodr. 5: 489. 1836; Benth. et Hook. f., Gen. Pl. 2:
361. 1873; O. Hoffm. in Engl. et Prantl. Pflanzenf. 4,
5: 231. 1890, nom. cons.

一年生草本,有分枝,被糙毛。叶对生,全缘或具齿。头状花序小,常生于枝端或叶腋,具花序梗异型,放射状;总苞钟状,总苞片2层,草质,内层稍短,花托凸起,托片膜质,披针形或线形。外围的雌花2层,结实,花冠舌状,白色,开展,舌片短而狭,全缘或2齿裂中央的两性花多数,花冠管状,白色,结实,顶端具4齿裂;花药基部具极短2浅裂;花柱分枝扁,顶端钝,有乳头状突起;瘦果三角形或扁四角形,顶端截形,有1—3个刚毛状细齿,两面有粗糙的瘤状突起。

本属有4种,主要分布于南美洲和大洋洲。我国有1种。

1. 鳢肠(唐本草) 旱莲草,墨菜 图版 58: 1—5

Eclipta prostrata (L.) L., Mant. 2: 286. 1771; Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 1109. 1936; Kitam. in Mem. Coll. Sci. Kyoto Univ. ser. B. 16: 266. 1942; 裴鉴等,江苏南部种子植物手册 763. 图 1228. 1959.——*Verbesina prostrata* L. Sp. Pl. 902. 1753, ed 2. 1227. 1763.——*Verbesina alba* L., 1. c.——*Eclipta erecta* L., Mant. 2: 286. 1771; Lour., Fl. Cochinch. 505. 1790; Chen in Bull. Fam. Mem. Inst. Biol. 5: 55. 1934.——*Eclipta thermalis* Bunge in Mém. Acad. Sci. St. Pétersb. Sav. Etrang. 2: 113. 1833.——*Eclipta alba* (L.) Haask., Pl. Jav. Rav. 528. 1848; Benth., Fl. Hongk. 181. 1861; Franch., Pl. David. 165. 1884; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 433. 1888; Komar., Fl. Manch. 3: 629. 1907; Hayata, Comp. Formos. 17. 1904 et Ic. Pl. Formos. 8: 59. 1919; Merr. in Lingn. Sci. Journ. 5: 184. 1927; Ling in Contrib. Inst. Bot. Nat. Acad. Peip. 2: 489. 1934; Chang in Sunyats. 3: 292. 1937; Kitag., Lineam. Fl. Mansh. 449. 1939; 侯宽昭,广州植物志 547. 1956; 刘慎谔等,东北植物检索表 383. 1959.——*Eclipta marginata* Bo-