

疏柔毛，筒部长近3毫米；管状花花冠黄色，长约4毫米，下部骤然收缩成细管状，檐部5裂，裂片长圆形，顶端钝，被疏短毛。瘦果倒卵形，长约4毫米，宽近3毫米，具3—4棱，基部尖，顶端宽，截平，被密短柔毛。无冠毛及冠毛环。花期几全年。

产台湾、广东南部及其沿海岛屿、广西、云南等地。生草地、林下或灌丛中，海岸干燥砂地上也时常可见。印度、中南半岛、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、日本及大洋洲也有分布。

2. 麻叶蟛蜞菊

Wedelia urticifolia DC. in Wight, Contrib. Bot. Ind. 18. 1834, et Prodr. 5: 539. 1836. p. p.; Hook. f., Fl. Brit. Ind. 3: 306. 1881; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 434. 1888; Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 1109. 1936.

直立或斜升草本，有时呈攀援状。茎圆柱形，高20—80厘米或达1米，分枝，有粗沟纹，被稍开展的糙毛或下部脱毛，节间长9—15厘米。叶有5—40毫米的柄，叶片卵形或卵状披针形，连叶柄长10—13厘米，宽3—7厘米，基部通常短楔尖或稀浑圆，顶端渐尖，边缘有不规则的锯齿或重齿，上面被有基部为疣状的糙毛，下面的毛较细密，近基出三脉，中脉中部以上常有1—3对侧脉，网脉通常明显；上部叶小，有短柄或无柄，叶片披针形，长2.5—6厘米，宽1—2.5厘米，基部通常浑圆，稀楔尖，顶端短尖或渐尖。头状花序少数，径达2—2.5厘米，每两个生叶腋，或单生枝顶；花序梗长2—3厘米，稀达6厘米或更长，被白色开展的糙毛；总苞阔钟形或半球形，径约15毫米；总苞片2层，外层叶质，绿色，长圆形或倒披针形，长约8毫米，宽3—4毫米，顶端渐尖，背面密被长粗毛，内层长圆形至倒卵状长圆形，长5—6毫米，顶端钝，被疏毛；托片折叠成长圆形，长约8毫米，顶端芒尖或中央的骤然紧缩成芒状刺尖，背面及上部边缘被粗毛。舌状花1层，黄色，舌片卵状长圆形，长约11毫米，宽约4毫米，顶端2齿裂，稀3裂，管部短，长3—4毫米。管状花多数，黄色，檐部5浅裂，裂片三角状渐尖，被疏毛。瘦果倒卵形、背腹略扁，长约4毫米，宽2—3毫米，褐红色，密被白色疣状突起，顶端收缩而近浑圆，收缩部分密被毛。冠毛短刺芒状，2—3个，不等长，基部有冠毛环。花期7—11月。

广产云南、贵州、广西、湖南南部、广东及其沿海岛屿。生溪畔、谷地、坡地或空旷草丛中。也分布于印度、中南半岛及印度尼西亚。

3. 山蟛蜞菊(海南植物志)

Wedelia wallichii Less. in Linnaea 6: 162. 1831; Hook. f., Fl. Brit.