

针形,长3—7厘米,宽(0.8)1—2.5厘米,顶端渐尖或长渐尖,常具小尖头,基部楔形,边缘有尖锯齿或常近缺刻,有2或3对细侧脉,上面及边缘被疏短伏毛,下面几无毛或仅沿脉被疏短毛;叶柄长5—8毫米,被短毛。头状花序卵状圆锥形,长9—11(14)毫米,宽6—8毫米,有或无舌状花;花序梗细长,长(3)4—14厘米或更长,顶端常被短柔毛;总苞片约8个,2层,几等长,绿色,卵状长圆形,长3—3.5毫米,顶端尖或稍钝,边缘有缘毛;花托圆柱状锥形,长4—8毫米,有长圆状舟形的膜质托片,花黄色;雌花舌状长约4毫米,舌片短,宽倒卵形,顶端3浅裂;两性花花冠管状,长约2毫米,具4—5个短裂片。瘦果长圆形,长1.5—2毫米,褐色,有白色的细边,两面常有少数疣点及疏短毛或无毛,边缘有缘毛或无毛,顶端有2个不等长的细芒,易脱落。花果期5月—12月。

产云南南部及东南部(思茅、易武、勐海、景洪、麻栗坡、景东、楚雄等)。生于山谷溪边、潮湿的沟边、林缘或路旁荒地,海拔1000—1900米。模式标本采自思茅。

全草药用,有消炎、消肿、止血止痛的功效,主治外伤出血、风湿关节痛、腰痛及跌打损伤等。

此种茎匍匐或平卧,叶具尖锯齿或近缺刻,具有较长的节间及花序梗,与上种显然不同。

80. 金腰箭属——*Synedrella* Gaertn.

Gaertn., *Fruct. Sem. Plant.* 2: 456. 1791; Benth. et

Hook. f., *Gen. Pl.* 2: 383. 1873.

一年生草本。茎直立,分枝,被短或长柔毛。叶对生,具柄,边缘有不整齐的齿刻。头状花序小,异型,无或有花序梗,簇生于叶腋和枝顶,稀单生,外围雌花1至数层,黄色,中央的两性花略少,全部结实。总苞卵形或长圆形;总苞片数个,不等大,外层叶状,内层狭,干膜质,鳞片状。花托小,有干膜质的托片。雌花花冠舌状,舌片短,顶端2—3齿裂;两性花管状,向上稍扩大,檐部4浅裂。雄蕊4个,花药顶端浑圆,基部全缘、截平或有矢状短耳。花柱分枝纤细,顶端尖。雌花瘦果平滑,扁压,边缘有翅,翅具撕裂状硬刺;两性花的瘦果狭,扁平或三角形,无翅,常有小突点。冠毛硬,刚刺状。

约50种,产美洲、非洲热带,其中一种广布于全世界热带和亚热带地区。我国仅1种,产东南至西南各省区。