


1. 金腰箭(种子植物名称) 图版 61: 3—6

Synedrella nodiflora (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Plant. 2: 456. t. 171, fig. 7. 1791; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 3: 605. t. 66, fig. 1—7. 1924; Merr. in Lingn. Sci. Journ. 5: 185. 1927; Ling in Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping 2: 490. 1934; Chang in Sunyats. 3: 294. 1937; Kitam. in Acta Phytotax. et Geobot. 9: 29. 1940, et in Mem. Coll. Sci. Kyoto Univ. ser. B. 16: 268. 1942; 海南植物志 3: 409. 图 811, 1974; 中国高等植物图鉴 4: 494. 图 6402, 1975.—*Verbesina nodiflora* L., Cent. Pl. 1: 28. 1755, et Amoen. Acad. 4: 290. 1759.

一年生草本。茎直立, 高 0.5—1 米, 基部径约 5 毫米, 二歧分枝, 被贴生的粗毛或后脱毛, 节间长 6—22 厘米, 通常长约 10 厘米。下部和上部叶具柄, 阔卵形至卵状披针形, 连叶柄长 7—12 厘米, 宽 3.5—6.5 厘米, 基部下延成 2—5 毫米宽的翅状宽柄, 顶端短渐尖或有时钝, 两面被贴生、基部为疣状的糙毛, 在下面的毛较密, 近基三出主脉, 在上面明显, 在下面稍凸起, 有时两侧的 1 对基部外向分枝而似 5 主脉, 中脉中上部常有 1—4 对细弱的侧脉, 网脉明显或仅在下面明显。头状花序径 4—5 毫米, 长约 10 毫米, 无或有短花序梗, 常 2—6 簇生于叶腋, 或在顶端成扁球状, 稀单生; 小花黄色; 总苞卵形或长圆形; 苞片数个, 外层总苞片绿色, 叶状, 卵状长圆形或披针形, 长 10—20 毫米, 背面被贴生的糙毛, 顶端钝或稍尖, 基部有时渐狭, 内层总苞片干膜质, 鳞片状, 长圆形至线形, 长 4—8 毫米, 背面被疏糙毛或无毛。托片线形, 长 6—8 毫米, 宽 0.5—1 毫米。舌状花连管部长约 10 毫米, 舌片椭圆形, 顶端 2 浅裂; 管状花向上渐扩大, 长约 10 毫米, 檐部 4 浅裂, 裂片卵状或三角状渐尖。雌花瘦果倒卵状长圆形, 扁平, 深黑色, 长约 5 毫米, 宽约 2.5 毫米, 边缘有增厚、污白色宽翅, 翅缘各有 6—8 个长硬尖刺; 冠毛 2, 挺直, 刚刺状, 长约 2 毫米, 向基部粗厚, 顶端锐尖; 两性花瘦果倒锥形或倒卵状圆柱形, 长 4—5 毫米, 宽约 1 毫米, 黑色, 有纵棱, 腹面压扁, 两面有疣状突起, 腹面突起粗密; 冠毛 2—5, 叉开, 刚刺状, 等长或不等长, 基部略粗肿, 顶端锐尖。花期 6—10 月。

产我国东南至西南部各省区, 东起台湾, 西至云南。生于旷野、耕地、路旁及宅旁, 繁殖力极强。原产美洲, 现广布于世界热带和亚热带地区。



1—2. 金纽扣 *Spilanthes paniculata* Wall. ex DC., 1.花枝;2.瘦果。3—6. 金腰箭 *Synedrella nodiflora* (L.) Gaertn. 3.花枝;4.舌状花;5.两性花;6.瘦果。(冯晋庸、吴彭桦绘)