

8—10 月。

原产北美的观赏植物。我国各地常见栽培。

82. 大丽花属——*Dahlia* Cav.

Cav., Ic. et Descr. Pl. 1: 56. 1791; Benth. et Hook.
f., Gen. Pl. 2: 386. 1873; O. Hoffm. in Engl. et Prantl.
Pflanzenf. 4, 5: 243. 1890.——*Georgina* Willd., Sp. Pl.
3: 3 124. 1803.

多年生草本。茎直立，粗壮。叶互生，1—3 回羽状分裂，或同时有单叶。头状花序大，有长花序梗，有异形花，外围有无性或雌性小花，中央有多数两性花。总苞半球形；总苞片 2 层，外层几叶质，开展，内层椭圆形，基部稍合生，几膜质，近等长。花托平，托片宽大，膜质，稍平，半抱雌花。无性花或雌花舌状，舌片全缘或先端有 3 齿；两性花管状，上部狭钟状，上端有 5 齿；花药基部钝；花柱分枝顶端有线形或长披针形而具硬毛的长附器。瘦果长圆形或披针形，背面扁压，顶端圆形，有不明显的 2 齿。

约 15 种，原产南美、墨西哥和美洲中部。有 1 种在我国广泛栽培。

1. 大丽花(中国植物名称) 别名：天竺牡丹(植物学大辞典)，西番莲(北京)，大理菊，苕菊，洋芍药(广州)

Dahlia pinnata Cav., Ic. et Descr. Pl. 1: 57. 1791; 侯宽昭等，广州植物志 545. 1956; 裴鉴等，江苏南部种子植物手册 767. 1959.——*Dahlia rosea* Cav., l. c. 3: 33. 1794. *Dahlia coccinea* Cav., l. c. 33. 1794.——*Georgina variabilis* Willd., Sp. Pl. 3: 3124. 1803.——*Dahlia purpurea* Poir., Encycl. Meth. Suppl. 2: 444. 1811.——*Dahlia variabilis* Desf., Cat. Hort. Paris ed. 3: 182. 1829.

多年生草本，有巨大棒状块根。茎直立，多分枝，高 1.5—2 米，粗壮。叶 1—3 回羽状全裂，上部叶有时不分裂，裂片卵形或长圆状卵形，下面灰绿色，两面无毛。头状花序大，有长花序梗，常下垂，宽 6—12 厘米。总苞片外层约 5 个，卵状椭圆形，叶质，内层膜质，椭圆状披针形。舌状花 1 层，白色，红色，或紫色，常卵形，顶端有不明显的 3 齿，或全缘；管状花黄色，有时在栽培种全部为舌状花。瘦果长圆形，长 9—12 毫米，宽 3—4 毫米，黑色，扁平，有 2 个不明显的齿。花期 6—12 月，果期