

长1.5—5厘米无翅的柄，三出，小叶3枚，很少为具5(—7)小叶的羽状复叶，两侧小叶椭圆形或卵状椭圆形，长2—4.5厘米，宽1.5—2.5厘米，先端锐尖，基部近圆形或阔楔形，有时偏斜，不对称，具短柄，边缘有锯齿，顶生小叶较大，长椭圆形或卵状长圆形，长3.5—7厘米，先端渐尖，基部渐狭或近圆形，具长1—2厘米的柄，边缘有锯齿，无毛或被极稀疏的短柔毛，上部叶小，3裂或不分裂，条状披针形。头状花序直径8—9毫米，有长1—6(果时长3—10)厘米的花序梗。总苞基部被短柔毛，苞片7—8枚，条状匙形，上部稍宽，开花时长3—4毫米，果时长至5毫米，草质，边缘疏被短柔毛或几无毛，外层托片披针形，果时长5—6毫米，干膜质，背面褐色，具黄色边缘，内层较狭，条状披针形。无舌状花，盘花筒状，长约4.5毫米，冠檐5齿裂。瘦果黑色，条形，略扁，具棱，长7—13毫米，宽约1毫米，上部具稀疏瘤状突起及刚毛，顶端芒刺3—4枚，长1.5—2.5毫米，具倒刺毛。

产华东、华中、华南、西南各省区。生于村旁、路边及荒地中。广布于亚洲和美洲的热带和亚热带地区。为我国民间常用草药，有清热解毒、散瘀活血的功效，主治上呼吸道感染、咽喉肿痛、急性阑尾炎、急性黄疸型肝炎、胃肠炎、风湿关节疼痛、疟疾，外用治疮疖、毒蛇咬伤、跌打肿痛。

白花鬼针草 金盏银盘(广东)

var. *radiata* Sch.-Bip. in Baker-Webb et Berthelot, Hist. Canar. 3 (2): 242. 1842—50; Kitamura in Mem. Coll. Sci. Kyoto Univ. Ser. B. 16: 279. 1940.——*B. pilosa* L. var. *albiflora* Maxim. in Cat. Herb. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo. 4. 1886;——*B. pilosa* var. *minor* (Bl.) Sherff in Bot. Gaz. 80: 387. 1925; 林镕, 北研丛刊 2: 492, 1934.

与原变种的区别主要在于头状花序边缘具舌状花5—7枚，舌片椭圆状倒卵形，白色，长5—8毫米，宽3.5—5毫米，先端钝或有缺刻。

分布区与原变种同，亦供药用，功效与原变种相同。

腊叶标本，特别是果期所采的标本，舌状花干萎脱落，与原变种不易区分。但在野外，此变种常与原变种混生一处，而具舌状花这一特征是稳定的，极易区别。

8. 金盏银盘(广州植物志) 图版 65: 1—4

Bidens biternata (Lour.) Merr. et Sherff in Bot. Gaz. 88: 293, 1929, et in Field Mus. Publ. Bot. 16: 388. t. 99. fig. a. c—m. 1937; 林镕, 北研丛刊 2: 492. 1934; Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 1110. 1936; Kitamura in Act. Phytotax. et Geobot. 9: 29. 1940; et in Mem. Coll. Sci. Kyoto. Univ.