

路旁。原产南美洲，在我国归化。全草药用，有止血、消炎之功效，对外伤出血、扁桃体炎、咽喉炎、急性黄胆型肝炎有一定的疗效。在欧洲及苏联，这个种也有归化的。此外，还有 1 种。

2. 粗毛牛膝菊

Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pav. Syst. Veg. Fl. Peruv. 198, 1798; Szafer, Kulcz., Pawl. Rosl. Polskie, 679, 1953—*G. parviflora* var. *hispida* auct. non Benth.; DC., Prodr. 5: 677, 1836.

分布不广，数量不多，仅见于庐山，生林下路旁。茎枝，尤以接花序以下，被开展稠密的长柔毛；叶边缘有粗锯齿或犬齿。

87. 羽芒菊属——*Tridax* L.

L., Sp. Pl. 900. 1753; Benth. et Hook. f., Gen. Pl. 2: 392. 1873.

多年生草本，有毛或无毛。叶对生，有缺刻状齿或羽状分裂。头状花序较少，异型，放射状，单生于茎、枝顶端，具长柄，外围雌花 1 层，淡黄色，中央的两性花黄色或绿色，全部小花结实。总苞卵形、钟形或近半球状，总苞片数层，覆瓦状排列，外层短宽，叶质，内层窄狭，较长，干膜质。花托扁平或凸起，托片干膜质。雌花花冠舌状或二唇形，外唇大，顶端 3 齿或 3 深裂，内唇小或极小，2 深或浅裂或不裂，两性花花冠管状，檐部稍扩大，5 浅裂。花药顶端尖，基部矢状，有短尖小耳。两性花花柱分枝顶端钻形，被毛。瘦果陀螺状或圆柱状，被毛。冠毛短或长，芒状渐尖，羽状。

约 26 种，分布于美洲热带及亚洲东南部。我国 1 种，产东南部及南部一些岛屿。

1. 羽芒菊（中国种子植物科属辞典） 图版 65: 5—7

Tridax procumbens L., Sp. Pl. 900. 1753; DC., Prodr. 5: 679. 1836; Hook. f., Fl. Brit. Ind. 3: 311. 1881; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 3: 609. 1924; Kitam. in Acta Phytotax. et Geobot. 9: 28. 1940. H. T. Chang in Sunyats. 7: 84. 1948; 中国高等植物图鉴 4: 499. 图 6412. 1975.

多年生铺地草本。茎纤细，平卧，节处常生多数不定根，长 30—100 厘米，基部径约 3 毫米，略呈四方形，分枝，被倒向糙毛或脱毛，节间长 4—9 毫米。基部叶略小，花期凋萎；中部叶有长达 1 厘米的柄，罕有长 2—3 厘米的，叶片披针形或卵状披针形，长 4—8 厘米，宽 2—3 厘米，基部渐狭或几近楔形，顶端披针状渐尖，边缘有不规则的