

3. 南茼蒿 *Ch. segetum* L.

1. 蒿子杆(北京) 图版 2: 3

Chrysanthemum carinatum Schousb. Vextr., Marokko, 198. 1800; DC., Prodr. 6: 65. 1837.——*Chrysanthemum coronarium* auct. non L.; 刘慎谔等, 东北植物检索表, 396. 1959, p. p.

光滑无毛或几光滑无毛, 高 20—70 厘米。茎直立, 通常自中上部分枝。基生叶花期枯萎。中下部茎叶倒卵形至长椭圆形, 长 8—10 厘米。二回羽状分裂, 一回深裂或几全裂, 侧裂片 3—8 对。二回为深裂或浅裂, 裂片披针形、斜三角形或线形, 宽 1—4 毫米。头状花序通常 2—8 个生茎枝顶端, 有长花梗, 并不形成明显伞房花序, 或头状花序单生茎顶。总苞径 1.5—2.5 厘米。总苞片 4 层, 内层长约 1 厘米。舌片长 15—25 毫米。舌状花瘦果有 3 条宽翅肋, 特别是腹面的 1 条翅肋伸延于瘦果顶端并超出花冠基部, 伸长成喙状或芒尖状, 间肋不明显, 或背面的间肋稍明显。管状花瘦果两侧压扁, 有 2 条突起的肋, 余肋稍明显。

农田栽培, 蔬菜用。吉林有野生。

2. 茼蒿 艾菜(海南植物志)

Chrysanthemum coronarium L., Sp. Pl. 890. 1753; DC. Prodr. 6: 64. 1837; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. 23: 437. 1888; Komar. in Act. Hort. Hetrop. 25: 646. 1907; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Add. Ser. 10: 146 (Fl. Kwangt. Hongk.). 1912; 刘慎谔等, 东北植物检索表 396. 1959, p. p.; 广东植物研究所, 海南植物志, 3: 413. 1974.——*Matricaria coronaria* (L.) Desr. in Lam. Encycl. 3: 737. 1792.——*Chrysanthemum spatiosum* auct. non Bailey; 北京植物志, 中册, 1002. 1964.

光滑无毛或几光滑无毛。茎高达 70 厘米, 不分枝或自中上部分枝。基生叶花期枯萎。中下部茎叶长椭圆形或长椭圆状倒卵形, 长 8—10 厘米, 无柄, 二回羽状分裂。一回为深裂或几全裂, 侧裂片 4—10 对。二回为浅裂、半裂或深裂, 裂片卵形或线形。上部叶小。头状花序单生茎顶或少数生茎枝顶端, 但并不形成明显的伞房花序, 花梗长 15—20 厘米。总苞径 1.5—3 厘米。总苞片 4 层, 内层长 1 厘米, 顶端膜质扩大成附片状。舌片长 1.5—2.5 厘米。舌状花瘦果有 3 条突起的狭翅肋, 肋间有 1—2 条明显的间肋。管状花瘦果有 1—2 条椭圆形突起的肋, 及不明显的间肋。花果期 6—8 月。

我国各地花园观赏栽培。河北、山东等地有野生。

3. 南茼蒿

Chrysanthemum segetum L. Sp. Pl. 889, 1753; DC., Prodr. 6: 64. 1837.——*Matricaria segetum* (L.) Schrank, Baier. Fl. 2: 406. 1789.——*Pyrethrum segetum* (L.) Moench, Meth. 597. 1794.——*Chrysanthemum coronarium* var. *spatiosum*