

锯齿,先端渐尖。

产四川东部与中部;生于中、低海拔地区的路旁、林缘及林下。模式标本采自四川美姑。

系 3. 奇蒿系——Ser. 3. *Anomalae* Y. R. Ling in Bull. Bot. Res. **8**(4):42. 1988. — *Artemisia* Subsect. *Monophyllae* Kitam. in Mem. Coll. Sci. Kyoto Univ. ser. B. **15**(3):413. 1940. p. p.

多年生草本。茎、枝、叶面初时被微柔毛,后无毛,叶背密被绵毛或初时微被绵毛,后脱落。中部叶卵形或长卵形,不分裂,边缘具细锯齿。头状花序直径 2—2.5 毫米,在茎上排成狭窄或稍开展的圆锥花序。

本系我国有 1 种,1 变种。

134. 奇蒿 (江苏南部种子植物手册) 刘寄奴(唐·新修本草,中药俗称),金寄奴(日华子本草),乌藤菜(通志),珍珠蒿(台湾植物志),南刘寄奴(湖北、江西),六月霜、九里光、野马兰头(江苏),化食丹(上海),六月雪、白花尾(江西),苦婆菜(福建),细白花草(湖南),“黑补标”、“黑艾”(瑶族土名)

Artemisia anomala S. Moore in Journ. Bot. Brit. For. **13**: 227. 1875; Hemsl. in Journ. Bot. 208. 1876; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **23**: 441. 1888; Diels in Engl. Bot. Jahrb. **29**: 618. 1900; Hayata, Ic. Pl. Formos. **8**: 63. 1919; Pamp. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. n. s. **34**: 639. 1927, **39**: 21. 1932 et **46**: 553. 1939; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 1116. 1936; Kitam. in Mem. Coll. Sci. Kyoto Univ. ser. B. **15**(3): 415. 1940; 江苏南部种子植物手册 782, 图 1261. 1959; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **18**(1—2): 122. 1965; 中国高等植物图鉴 **4**: 533, 图 6480. 1975; 台湾植物志 **4**: 785. 1978; 江苏植物志 下: 873, 图 2194. 1982. — *A. vulgaris* Linn. var. *integrifolia* auct., non Maxim.: Francn. Pl. David. **1**: 169. 1884.

134a. 奇蒿(原变种) 图版 24: 9—15

var. *anomala*

多年生草本。主根稍明显或不明显,侧根多数;根状茎稍粗,直径 3—5 毫米,弯曲,斜向上。茎单生,稀 2 至少数,高 80—150 厘米,具纵棱,黄褐色或紫褐色,初时被微柔毛,后渐脱落;上半部有分枝,枝弯曲,斜向上或略开展,长 5—15 厘米。叶厚纸质或纸质,上面绿色或淡绿色,初时微有疏短柔毛,后无毛,背面黄绿色,初时微有蛛丝状绵毛,后脱落;下部叶卵形或长卵形,稀倒卵形,不分裂或先端有数枚浅裂齿,先端锐尖或长尖,边缘具细锯齿,基部圆形或宽楔形,具短柄,叶柄长 3—5 毫米;中部叶卵形、长卵形或卵状披针形,长 9—12(—15) 厘米,宽 2.5—4(—5.5) 厘米,先端锐尖或长尖,边缘具细锯齿,基部圆形或宽楔形,叶柄长 2—4(—10) 毫米;上部叶与苞片叶小,无柄。头状花序长圆形或卵形,直径