

产内蒙古(北部);生于干草原、干山坡、戈壁等地。蒙古也有。模式标本采自蒙古。

146. 光沙蒿 (东北植物检索表) 沙蒿(内蒙古植物志), 小白蒿(内蒙古), 红杆蒿(河北), “给鲁格日-沙里尔日”、“塔腾海-沙巴嘎”(蒙语名)

Artemisia oxycephala Kitag. in Rep. First Sci. Exped. Manch. 4(4): 51, 93. 1936. — *A. pubescens* Ledeb. var. *oxycephala* (Kitag.) Kitag. Lineam. Fl. Mansh. 429. 1939; Noda, Fl. N.-E. Prov. (Manch.) China 1220. 1971. — *A. campestris* auct., non Linn.: Kitam. in Mem. Coll. Sci. Kyoto Univ. ser. B. 15(3): 380. 1940, p. p., quoad pl. Bor.-Or. et Bor. Sin.; 东北植物检索表 393, 图版 135, 图 7. 1959; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. 18(1—2): 126. 1965. p. p., quoad pl. Bor.-Or. et Bor. Sin. — *A. arenaria* auct., non DC.: H. C. Fu, 内蒙古植物志 6: 123, Tab. 43, fig. 7, 8. 1982.

半灌木状草本或为小灌木状。主根木质, 粗长; 根状茎稍粗短, 木质, 具多数营养枝。茎多枚, 成丛, 直立或斜上升, 高 50—80 厘米, 具纵棱, 下半部木质, 暗紫色或紫色, 无毛, 老时皮成薄片状剥落, 上部草质, 黄褐色, 具分枝与小枝, 枝斜向上。叶厚纸质, 干时质稍硬, 两面无毛或幼时微有短柔毛, 后无毛; 基生叶宽卵形, 具长柄, 花期萎谢; 茎下部与中部叶宽卵形或近圆形, 长 2—5 厘米, 宽 2—3 厘米, 二回羽状全裂, 每侧有裂片 2—3 枚, 侧边中部与下部裂片常再 3 全裂, 小裂片狭线形, 长 1.5—2 厘米, 宽 1.5—2 毫米, 先端锐尖, 有硬尖头, 基部半抱茎, 近无叶柄; 上部叶与苞片叶 3—5 全裂或不分裂, 而为狭线形。头状花序长卵形。直径 1.5—2.5(—3.5) 毫米, 具短梗, 梗长 2—4 毫米或近无梗, 基部具小苞叶, 直立, 在分枝上排成穗状花序式的总状或复总状花序, 并在茎上组成疏松、开展、稍稍密集的圆锥花序; 总苞片 3—4 层, 覆瓦状排列, 外、中层总苞片卵形或长卵形, 背面具绿色中肋, 无毛, 边膜质, 内层总苞片长卵形或椭圆形, 半膜质, 先端钝; 花序托凸起; 雌花 8—14 朵, 花冠狭圆锥状或狭管状, 花柱线形, 稍伸出花冠外, 先端 2 叉, 叉端尖; 两性花 3—10 朵, 不孕育, 花冠管状, 外面有腺点, 花药线形, 先端附属物尖, 长三角形, 基部圆钝, 花柱短, 先端棒形, 2 裂, 不叉开。瘦果长圆形。花果期 8—10 月。

产黑龙江(西部)、吉林(西部)、辽宁(西部)、内蒙古、河北(北部)、山西(北部); 生于干草原、干山坡、固定沙丘、沙碱地或湖滨沙地, 也见于森林草原附近地区, 局部地区成植物群落的建群种或主要伴生种。模式标本采自辽宁西部。

可作防风固沙的辅助性植物。牧区作牲畜的饲料。

147. 荒野蒿 (植物研究)

Artemisia campestris Linn. Sp. Pl. 2: 846. 1753; Willd. Sp. Pl. 3: 1827. 1800; Bess. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 8: 40. 1835; DC. Prodr. 6: 96. 1837; Ledeb. Fl. Ross. 2(2): 565. 1844—1846; Boiss. Fl. Or. 3: 363. 1875; Poljak. Фл. СССР 26: 553. 1961, excl. vars.; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. 18(1—2): 126.