

Artemisia forrestii W. W. Smith in Not. Bot. Gard. Edinb. **12**:195. 1920; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **18**(1—2): 133. 1965.

半灌木状草本。主根明显,木质,垂直,侧根少数;根状茎稍粗,直径0.5—2厘米,木质,有少数营养枝。茎少数或单生,直立,高50—75厘米,下部木质或半木质,稍粗,纵纹明显;上半部有分枝,枝斜向上展,长6—8厘米;枝、叶两面密被灰白色柔毛。叶纸质,基生叶萎谢;茎下部与中部叶卵形,长2.5—4厘米,宽1.5—3厘米,羽状全裂,每侧有裂片2枚,裂片线状披针形,长1.5—2厘米,宽1—1.5(—2)毫米,先端尖,具短柄;上部叶3—5全裂;苞片叶小,3全裂或不分裂,裂片或不分裂的苞片叶线状披针形或狭线形。头状花序小,近球形,直径2—2.5毫米,具短梗或近无梗,在分枝的小枝上排成穗状花序状的总状花序,而在茎上组成狭窄或中等开展的圆锥花序;总苞片3—4层,外层总苞片椭圆形或长卵形,背面无毛,先端钝,边宽膜质,中、内层总苞片长卵形,边宽膜质或全为半膜质;雌花2—3朵,小,花冠狭管状,檐部具2裂齿,花柱略伸出花冠外,先端2叉,叉端钝尖;两性花4—8朵,不孕育,花冠管状,花药线形,先端附属物狭长,三角形,基部具小尖头,花柱比花冠短,先端棒状,2裂,不叉开。瘦果小。花果期9—11月。

云南特有种;生于海拔2200—3800米的山坡及旷野。模式标本采自云南西北部。

157. 小亮苞蒿 (植物研究)

Artemisia mairei Lévl. in Fedde, Rep. Sp. Nov. **11**:303. 1912 et Pl. Yunnan 38. 1915.; Pamp. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. n. s. **34**:678. 1927, incl. f. *latifolia* Pamp; Hand. -Mazz. Symb. Sin. **7**:1114. 1936; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **18**(3—4): 242. 1965.

多年生草本。主根稍明显;根状茎稍粗,具少数营养枝。茎数枚,高40—60厘米,下部半木质,纵纹明显;上部分枝,枝长5—7厘米;枝、叶两面密被灰黄色柔毛。叶纸质,茎下部与中部叶卵形,长1.5—3厘米,宽1—2厘米,羽状全裂,每侧有裂片2枚,裂片钻形或狭线状钻形,长1—1.5厘米,宽1毫米,先端尖;上部叶与苞片叶3全裂或不分裂,裂片或不分裂的苞片叶钻形。头状花序小,近球形,直径(1.5—)2毫米,无梗,在分枝或分枝的小枝上排成穗状花序,而在茎上组成狭窄或中等开展的圆锥花序;总苞片3—4层,外层总苞片椭圆形,边膜质,中、内层总苞片长卵形,边宽膜质或全为半膜质;雌花2—3朵,花冠狭管状,檐部具2裂齿,花柱伸出花冠外,先端2叉,叉端尖;两性花3—7朵,不孕育,花冠管状,花药线形,先端附属物尖,长三角形,基部钝,花柱短,先端2裂。瘦果小。花果期8—11月。

产云南;生于海拔2200—3600米附近的山坡与路旁。模式标本采自云南东川。

158. 柔毛蒿 (植物研究) 立沙蒿(东北植物检索表), 变蒿(中国高等植物图鉴), 麻蒿(甘肃、陕西), 米拉蒿(甘肃), 转蒿(河北), “呼尔干—沙里尔日”、“马尔托什”(蒙语名)

Artemisia pubescens Ledeb. in Mém. Acad. Sci. Pétersb. **5**:568. 1805 et Fl.