

区也有。模式标本采自克什米尔地区。

入药,与原变种同。

168. 纤梗蒿 (西藏植物志)

Artemisia pewzowi C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. **13**(1): 3. 1893; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **18**(3—4): 248. 1965; 西藏植物志 **4**: 780. 1985.

一、二年生或近于多年生草本。主根单一,狭纺锤状,垂直。茎少数或单一,高40—50厘米,基部稍粗,略木质化;自基部分枝,枝开展,长5—15厘米或更长,紫红色或黄褐色,有细纵棱;茎、枝、叶初时被灰白色短柔毛,后脱落。基生叶与茎下部叶卵形,长2—3厘米,宽1—1.5厘米,二回羽状全裂,每侧裂片2—3枚,每裂片再羽状全裂或3全裂,小裂片狭线状披针形或椭圆状披针形,长3—5毫米,宽0.5—1毫米,叶柄长1.5—3.5毫米;中部叶二回羽状全裂,每侧裂片(1—)2—3枚,每裂片再3—5全裂,小裂片丝线形或近毛发状,长0.5—1厘米,宽0.3—0.5毫米,基部有小型的假托叶,近无柄;上部叶3—5全裂,裂片狭线形或丝线形,无叶柄。头状花序小,卵球形,直径1—1.5毫米,有纤细的短梗,通常数枚在分枝的小枝上排成疏松的总状花序,在各分枝上排成复总状花序,而在茎上常组成开展、并具多级分枝的圆锥花序,有时为中等开展或略狭窄的圆锥花序;总苞片3—4层,外层总苞片小,质薄,长卵形,背面无毛,边狭膜质,中、内层总苞片卵形或椭圆形,半膜质或全膜质;雌花2—4朵,花冠狭管状,檐部具2(—3)裂齿,花柱伸出花冠外,先端2叉,叉端尖;两性花3—8朵,不孕育,花冠管状,花药线形,先端附属物尖,长三角形,基部圆钝,花柱短,先端略膨大,2裂,不叉开,退化子房不明显。瘦果小。花果期8—11月。

产青海、新疆及西藏;新疆分布在海拔1000—1800米地区,青海、西藏分布在海拔2800—3800米地区,生于荒漠草原、砾质坡地等,局部地区可成为植物群落的优势种。苏联(中亚地区)也有。模式标本采自昆仑山地区。

系7. 白沙蒿系——Ser. 7. *Blepharolepides* Y. R. Ling in Bull. Bot. Res. **8**(4):54. 1988

一年生草本;茎、枝、叶两面密被短柔毛。茎中部叶二回栉齿状的羽状分裂,第一回全裂,每侧有裂片5—8枚,第二回为栉齿状深裂,裂片每侧具5—8枚栉齿。头状花序小,直径1.5—2毫米,在茎上组成开展的圆锥花序。

本系我国有1种。

169. 白沙蒿(中国高等植物图鉴) 糜蒿(内蒙古植物志),白沙蒿、白里蒿(内蒙古),“苏儿目斯图-沙里尔日”(蒙语名)

Artemisia blepharolepis Bge. in Mém. Acad. Sci. Pétersb. **7**:340. 1854; Maxim. in Bull. Acad. Sci. Pétersb. **17**:428. 1872; Grub. in Nov. Syst. Pl. Vas. Acad. Sci. URSS **9**:282. 1972.