

与原变种区别在于本变种茎中部与上部叶通常不分裂,稀为3深裂。头状花序具梗,梗长0.5—1厘米。

产河北及内蒙古。模式标本采自河北小五台山。

186. 错那蒿 (西藏植物志) 灰蒿(俗称),“察尔汪”(藏语名)

Artemisia conaensis Ling et Y. R. Ling in Act. Phytotax. Sin. 18(4): 511, fig. 9. 1980; 西藏植物志 4: 785, 图 342. 1985.

多年生草本。主根稍明显,侧根细,少数;根状茎稍粗短,斜向上,直径3—8毫米,偶有少数营养枝。茎单生或少数,高30—80厘米,暗褐色,有纵棱;上部多分枝,斜上展,长2—8厘米;茎、枝幼时微有灰绿色柔毛,后毛渐脱落。叶纸质,叶面疏被灰绿色柔毛,背面密被灰白色蛛丝状柔毛,干时叶两面灰黑色;茎下部与中部叶椭圆形,长0.5—2厘米,宽1—1.5厘米,3—5或7深裂,每侧有裂片1—2(—3)枚,裂片线形、线状披针形或长椭圆状披针形,长0.5—0.8(—1)厘米,宽1—2(—3)毫米,先端尖,侧边基部与中部裂片偶再分裂,具1—2枚椭圆形深裂的小裂片,无柄,基部具小型、半抱茎的假托叶;上部叶与苞片叶3—5深裂或不分裂,裂片或不分裂的苞叶片为线形或线状披针形。头状花序多数,球形或近半球形,直径2—3毫米,具短梗或近无梗,有小苞叶,在分枝上排成穗状花序或穗状花序式的总状花序或复总状花序,而在茎上组成中等开展或狭窄的圆锥花序;总苞片3—4层,背面无毛,中肋绿色,外、中层总苞片卵形或长卵形,边缘膜质,内层总苞片长卵形或长圆形;雌花5—10朵,花冠狭圆锥状,檐部具2裂齿,被短柔毛,花柱伸出花冠外,先端钝尖;两性花8—15朵,不孕育,花冠管状,檐部背面被短柔毛,花药线形,先端附属物尖,长三角形,基部圆钝,花柱短,先端稍叉开或不叉开,子房退化。瘦果小,长圆形或倒卵形。花果期7—10月。

产我国西藏(错那、加查、朗县);生于海拔3000—4000米的田边、滩地或砾质坡地等。模式标本采自西藏错那。

入药,我国西藏民间用于治疗气管炎及肺病等。

117. 绢蒿属*——*Seriphidium* (Bess.) Poljak.

Poljak. В Мат. Фл. Раст. Казах. 11: 171. 1961; Czerep. Add. Corr. Fl. URSS (1—30), 94. 1973; Y. R. Ling in Act. Phytotax. Sin. 18(4): 512. 1980 et in Bull. Bot. Res. 2(2): 28. 1982. — *Artemisia* Sect. *Seriphidium* Bess. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 1(8): 222. 1828; DC. Prodr. 6: 100. 1837; Ling in Contr. Inst. Bot. Nat. Peip. 2(10): 507. 1934. — *Artemisia* Sect. *Seriphidia* Less. Syn. Gen. Comp. 264. 1832. — *Artemisia* Subgen. *Seriphidium* (Bess.) Peterm. Deutschl. Fl. 294. 1848; Rouy, Fl. France 8: 298. 1903; Poljak. Фл. СССР 26: 562. 1961.

多年生草本或半灌木状或小灌木状,稀一、二年生草本;常有浓烈的香味。根通常粗