

内层总苞片长卵形或长圆状倒卵形,半膜质,背面疏被毛或近无毛;两性花 3—9(—13)朵,花冠管状,具腺点,花药线形,先端附属物线形,基部钝,花柱与花冠近等长,先端稍叉开,先端钝,微有睫毛。瘦果长倒卵形。花果期 8—10 月。

产内蒙古东部呼伦贝尔盟与锡林郭勒盟;生于低海拔地区砾质坡地、半荒漠草原或河湖岸边草甸及草原上。模式标本采自内蒙古呼伦贝尔盟。

北川政夫(M. Kitagawa)报道的海滨绢蒿(*Artemisia maritima* sensu Kitag., non Linn.(分布我国东北),实是本种的错误鉴定。

头状花序含 ϵ , β -山道年(1, β -santonin),经化学处理转化成 α -山道年后,亦可作驱蛔虫药的原料;另外还含东北蛔蒿素[finitin($C_{13}H_{20}O$)]等。

5. 蒙青绢蒿 (植物研究)

Seriphidium mongolorum (Krasch.) Ling et Y. R. Ling in Bull. Bot. Res. 1984. — *Artemisia mongolorum* Krasch. in Act. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS 1(3): 350. 1937; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. 18(3—4): 245. 1965; Czerep. Add. Corr. Fl. URSS (1—30), 59. 1973. — *A. nitrosa* auct., non Web. ex Stechm.: Poljak. Фл. СССР 26: 580. 1961. p. p., quoad syn. *A. mongolorum* Krasch.

半灌木状草本。主根稍粗,明显,木质;根状茎粗,木质,具细短的营养枝。茎少数或多数,高 30—45 厘米,直立或斜向上,下部木质,上部半木质;自中下部开始分枝,下部枝长 8—15 厘米,开展,弯曲,斜向上,偶有短的小枝;初时茎、枝密被苍白色绒毛,以后茎下部近光滑,绿色,茎上部毛部分脱落。叶两面初时密被苍白色绒毛,后渐脱落,具稀疏毛或近无毛;茎下部叶椭圆形或长卵形,长 3—4 厘米,宽 2—3 厘米,二(至三)回羽状全裂,每侧有裂片 4—5 枚,再次羽状全裂或 3 全裂,小裂片狭线形或狭线状披针形,长 2—3 毫米,宽 1—1.5 毫米,微有腺点,先端锐尖,叶柄长 1.5—2.5 厘米,基部有小型羽状全裂的假托叶;中部叶一至二回羽状全裂,小裂片狭线形,宽约 1 毫米;上部叶与苞片叶羽状全裂或 3 全裂。头状花序椭圆形或长卵形,直径 2—3 毫米,直立,无梗,基部有小苞叶,在分枝端或分枝的小枝上 2 至数枚密集着生排成密穗状花序,并在分枝上排成疏离的复穗状花序,而在茎上再组成略为开展或伸长的圆锥花序;总苞片 4—5 层,外层总苞片短小,卵形或狭卵形,向内渐增长,中、内层总苞片椭圆形或长卵形,外、中层总苞片背面初时被灰白色柔毛,后脱落,无毛,有绿色中肋,边膜质,内层总苞片半膜质,无毛;两性花 3—6 朵,花冠管状,背面有腺点,花药线形,先端附属物披针形,基部有短尖头,花柱短,开花时先端 2 叉,叉端截形,有睫毛。瘦果倒卵形。花果期 8—10 月。

产内蒙古及青海(北部);生于海拔 1100—2700 米附近的荒漠化或半荒漠草原及低山区的砾质坡地与戈壁等地区。蒙古西南部也有。模式标本采自青海柴达木盆地。

6. 卡拉套绢蒿 (植物研究)