

裂或3全裂。头状花序长圆形或长卵钟形,直径2—2.5毫米,无梗或具极短的梗,基部具细小、线形的小苞叶,在分枝的小枝上排成穗状花序,而在茎上组成开展或中等开展、尖塔形的圆锥花序;总苞片5—6层,背面微被灰白色蛛丝状短柔毛,外层总苞片小,卵形,边狭膜质,中、内层总苞片长卵形,边宽膜质或全为半膜质;两性花5—8朵,花冠管状,檐部黄色或淡紫色,花药线形,先端附属物披针形,基部圆钝,花柱短,先端2裂。瘦果倒卵形或长卵形。 花果期8—10月。

产甘肃中、西部至新疆鄯善;生于海拔1300—1380米附近的沙砾质滩地。模式标本采自甘肃民勤。

牧区作饲料,亦作绿肥。

组 3. 三裂叶绢蒿组——Sect. 3. *Juncea* (Poljak.) Y. R. Ling et C. J. Humphries in Bull. Bot. Res. 8(3):122. 1988. — *Artemisia* Sect. *Junceum* Poljak. Фл. СССР 26: 626. 1961.

多年生草本或半灌木状。植株常被绒毛或柔毛。叶二回或一回三出全裂。

我国有1种,1变种,隶属于1个系中。产新疆。苏联也有。

组模式种: 三裂叶绢蒿 *S. junceum* (Kar. et Kir.) Poljak.

系 1. 三裂叶绢蒿系——Ser. 1. *Juncea*——*Artemisia* Ser. *Appressopilosae* Poljak. Фл. СССР 26: 629. 1961.

多年生草本或为半灌木状。根状茎稍粗,木质;茎、枝、叶两面及总苞片背面被简单或分叉、平贴的柔毛。茎下部叶一回,稀二回三出全裂,裂片或小裂片狭线形、线状倒披针形或线状披针形。头状花序在茎上排成狭窄的圆锥花序。

本系我国有1种,1变种。

31. 三裂叶绢蒿 (新拟)

Seriphidium junceum (Kar. et Kir.) Poljak. В Мат. Фл. Раст. Казах. 11: 175. 1961; Czerep. Add. Corr. Fl. URSS (1—30), 95. 1973. — *Artemisia juncea* Kar. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 15:383. 1842; Ledeb. Fl. Ross. 2:576. 1844—1846; Poljak. Фл. СССР 26:629. 1961; Filat. Фл. Казах. 9:116. 1966.

31a. 三裂叶绢蒿 (原变种) 图版 39: 10—15

var. ***junceum***

半灌木状草本。主根明显,粗,木质;根状茎粗、短、木质,上部具多数短小、木质、多年生的营养枝,被黄褐色、开裂成纤维状的薄皮。茎多枚,直立,高20—40厘米,具纵纹,下部木质,上部半木质,并有短或略长与开展的分枝;茎、枝均密被灰白色、平贴的短柔毛。叶两面密被灰白色平贴的短柔毛;茎下部叶与营养枝叶宽卵形或倒卵形,长1.5—5厘米,宽