

144. 瓜叶菊属 *Pericallis* D. Don

D. Don in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. 2, text to Plate 228.

1834.

草本或半灌木，被疏灰白色绒毛或无毛。叶互生或基生，边缘具钝或锐锯齿，稀羽状分裂。头状花序多数，在枝端排列成疏伞房状；总苞钟状；总苞片1层，等长，顶端钝或尖，边缘膜质；花序托平，无苞片，具异形小花；边缘小花舌状，雌性，能育，稀无舌状花；中央的小花管状，两性，能育或不育；花药基部截形或耳状短箭形；花柱分枝伸长，顶端截形，被画笔状毛。瘦果背面压扁；舌状花瘦果卵形，通常具翅；管状花瘦果与舌状花瘦果同形或长圆形，具5棱；冠毛1—2层，有时脱落。

约15种，主产加那利群岛马德拉岛及亚速尔群岛。我国习见栽培1种。

1. 瓜叶菊

Pericallis hybrida B. Nord. in Opera Bot. 44: 21. 1978. — *Cineraria cruenta* Masson ex L'Herit. Sert. Angl. 26. 1860; Hsia in Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping 1: 68. 1931; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan. Mus. 19: 49. 1966; 秦岭植物志 1 (5): 287. 1985. — *Senecio cruentus* (Masson ex L'Herit) DC. Prodr. 6: 410. 1938; 裴鉴等，江苏南部种子植物手册 790. 图 1277. 1959.

多年生草本。茎直立，高30—70厘米，被密白色长柔毛。叶具柄；叶片大，肾形至宽心形，有时上部叶三角状心形，长10—15厘米，宽10—20厘米，顶端急尖或渐尖，基部深心形，边缘不规则三角状浅裂或具钝锯齿，上面绿色，下面灰白色，被密绒毛；叶脉掌状，在上面下凹，下面凸起；叶柄长4—10厘米，基部扩大，抱茎；上部叶较小，近无柄。头状花序直径3—5厘米，多数，在茎端排列成宽伞房状；花序梗粗，长3—6厘米；总苞钟状，长5—10毫米，宽7—15毫米；总苞片1层，披针形，顶端渐尖。小花紫红色，淡蓝色，粉红色或近白色；舌片开展，长椭圆形，长2.5—3.5厘米，宽1—1.5厘米，顶端具3小齿；管状花黄色，长约6毫米。瘦果长圆形，长约1.5毫米，具棱，初时被毛，后变无毛。冠毛白色，长4—5毫米。花果期3—7月。

原产大西洋加那利群岛。我国各地公园或庭院广泛栽培。花色美丽鲜艳，色彩多样，是一种常见的盆景花卉和装点庭院居室的观赏植物。

9. 金盏花族 CALENDULEAE Cass.

Cass. in Dict. Sci. Nat. 22: 366. 1821, et ibidem 30: 322. 1824;

Bail. Hist. des Plantes 8: 194. 1882; O. Hoffman in Engl. u.