

花序。总苞圆柱状；总苞片2—3层，外层最短，3—5枚，内层最长，长5—8毫米，不呈覆瓦状排列。花托平，无托毛。舌状小花黄色或白色，舌片顶端截形，5齿裂；花柱分枝细长，花药基部附属箭头形。瘦果圆柱形，微扁，有10条高起纵肋，顶端截形，无喙。冠毛1层，白色，糙毛状。约10种，分布中国、日本、朝鲜。属模式未指定。

据文献记载，在我国台湾有两种及两变型，但我们没有见到台湾这个属的有关标本。现将这两个种及两变型的参考文献及简要特征抄整如下：

1. 假还阳参

Crepidiastrum lanceolatum (Houtt.) Nakai in Bot. Mag. Tokyo **34**: 150. 1920; Kitam. in Act. Phytotax. Geobot. **10**: 27. 1941 et **11**: 133. 1942; Hara, Enum. Sperm. Jap. **2**: 189. 1952; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **19** (3—4): 218. 1966. H. L. L., Fl. Taiwan **4**: 842. 1978. — *Prenanthes lanceolata* Houtt., Nat. Hist. II **10**: 383. 1779. — *P. integra* Thunb., Fl. Jap. 300, 1784. — *Chondrilla lanceolata* (Houtt.) Poret, Encycl. Suppl. **2**: 329. 1811. — *Youngia lanceolata* (Houtt.) DC., Prodr. **7**: 193. 1838. — *Crepis lanceolata* Sch.-Bip. in Zoll., Syst. Verz. Ind. Jap. **2**: 126. 1854, nom. nud.; Makino in Bot. Mag. Tokyo **17**: 87. 1903. — *C. integra* (Thunb.) Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. **2**: 190. 1865—1866; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **23**: 475. 1888. — *Hieracium integrum* (Thunb.) O. Kuntze, Rev. Gen. **1**: 345. 1891. — *Lactuca lanceolata* (Houtt.) Makino in Bot. Mag. Tokyo **27**: 257. 1913. — *Ixeris lanceolata* (Houtt.) Stebbins in Journ. Bot. Brit. For. **75**: 46. 1937, non Chang 1932. — *Crepis koshunensis* Hayata, Ic. Pl. Formos. **8**: 79. 1918. — *Crepidiastrum koshunense* (Hayata) Nakai in Bot. Mag. Tokyo **34**: 149. 1920. — *Ixeris koshunensis* (Hayata) Stebbins in Journ. Bot. Brit. For. **75**: 45. 1937.

基生叶匙形，长10—12厘米，宽2—2.5厘米，顶端钝或圆形，基部收窄，边缘全缘，稍厚，两面无毛。茎叶小，披针形，长3.5厘米，宽1.5厘米，稀疏排列。头状花序稀疏伞房花状排列。总苞圆柱状钟状，长5—6毫米；总苞片2层，外层小，披针形，内层长，披针形，长5毫米，顶端钝，两面无毛。全部小花舌状，花冠管外面被柔毛。瘦果扁，近圆柱状，长4毫米，有10条纵肋。冠毛白色，长3.5毫米，糙毛状。产日本。

这个种还有两个变型，它们是：

a) **C. lanceolatum** (Houtt.) Nakai f. **batakanense** (Kitam.) Kitam. in Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto Ser. B. **22**: 108. 1955; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **19** (3—4): 219. 1966. — *Lactuca lanceolata* (Houtt.) Makino var. *batakanensis* Kitam. in Act. Phytotax. et Geobot. **2**: 45. 1933. — *Crepidiastrum lanceolatum* (Houtt.) Nakai var. *batakanense* (Kitam.) Nemoto, Fl. Jap. Suppl. 770. 1936; Kitam. in Act. Phytotax. et Geobot. **10**: 27. 1941.