

8. 箨鞘顶端为截形，近于两侧对称而不耸起；箨片长度不超过箨鞘的 1/2。

9. 箨鞘背面无毛 5. 苗竹仔 *S. dumetorum* (Hance) Munro

9. 箨鞘背面被黄褐色刺毛 6. 火筒竹 *S. xinwuense* Wen et J. Y. Chin

1. 薄竹 (植物分类学报) 图版 2

Schizostachyum chinense Rendle in Journ. Linn. Soc. Bot. **36**: 448. 1904; McClure in Lingnan Sci. Journ. **14** (4): 596. pl. 38. 1935. — *Leptocanna chinensis* (Rendle) Chia et H. L. Fung in Act. Phytotax. Sin. **19** (2): 213. pl. 7. 1981; 云南树木图志下册, 1286 页, 图 593. 1991.


竿高 5—8 米，直径 2—3 厘米；节间通直，长 30—45 厘米，上半部于幼嫩时被白色柔毛，老时毛落，并具硅质而使表面糙涩；分枝常于竿基部第三节上开始，近水平伸展。箨鞘幼时紫红色，老时变枯黄色，其长度常为其节间的一半；箨鞘近呈梯形，背部初时被白色小刺毛，老时毛落具硅质而稍变糙涩，先端近截形或两侧向中央倾斜下凹；箨耳呈极狭的线形；箨舌高约 1 毫米，近全缘；箨片窄三角形，先端长渐尖，基底宽约为箨鞘先端宽的 1/3，边缘在近先端部分内卷。叶鞘无毛，先端带紫红色；叶耳和鞘口繸毛俱缺；叶舌近截形，高约 1 毫米，近全缘；叶片披针形至长圆状披针形，长 15—26 厘米，宽 3—4.5 厘米，上表面无毛，下表面粗糙，次脉 7—9 对，小横脉明显，先端长渐尖，呈扭曲状而粗糙的尖头，基部近圆形或宽楔形；叶柄带紫红色，无毛，长约 5 毫米。花枝长 35—40 厘米，其节间纤细，无毛，长 3—6 厘米；次级分枝长 5—10 厘米，基部托以鞘状苞片，后者无毛，先端具芒状长尖头，基部抱茎。假小穗先端渐尖；先出叶作线状披针形，长 6—8 毫米，先端急尖或钝圆，两脊靠近，脊外的两边显著不等，脊上被纤毛，顶端密生柔毛成束；苞片卵状披针形乃至线状披针形，长 7—11 毫米，先端通常具芒尖或短尖头。小穗长达 14 毫米，先端渐尖；颖 2 片，呈卵状披针形乃至宽披针形，长 7—9 毫米，先端急尖而具锐利短尖头或钝圆形；不孕外稃卵状披针形，长 10—11 毫米，具 15 脉，背部中脊隆起；内稃长 9—12 毫米，具 6 脉，先端渐尖，顶具一束短毛；鳞被 3，长 0.5—2 毫米，边缘微被纤毛，脉纹不明显，前方两片作倒披针形，先端钝，后方一片为近卵形，先端急尖；花药长 4—9 毫米，基部具不等长的 2 裂（其长可达 1 毫米）；子房近棒状，花柱狭长，约与子房上端之棒状部分同长，柱头短，羽毛状。果实未见。

产云南的蒙自、屏边、金平等县，常生于海拔 1 500—2 500 米的山地常绿阔叶灌木林中。模式标本采自云南蒙自。

2. 岭南簕竹 (新拟)

Schizostachyum jaculans Holttum in Kew Bull. **1953** (4): 494. 1954.

竿细弱，长达 15 米，直径 1.5 厘米，尾梢长下垂或作攀援状；节间圆筒形，长达 72 厘米，下部光滑无毛，上部多少具硅质，被红棕色贴生刺毛，节下初时被白粉，竿壁厚 1.5 毫米；竿环平，光亮；箨环突起；竿每节分枝多数，大小相近，枝长 40—50 厘米。箨



图版 2 薄竹 *Schizostachyum chinense* Rendle; 1. 竿的一部分，示竿节和分枝；2. 竿箨背面观；3. 叶枝的上部；4. 先出叶；5. 先出叶中部的横切面（放大）；6. 末级花枝的末端，示其苞片及被包在苞片内的假小穗；7. 具芽苞片；8. 第一颖；9. 第二颖；10. 外稃；11. 内稃侧面观，示延伸的小穗轴，并在其顶端有一极退化的花；12. 内稃背面顶端部分放大，示其沟槽，槽内密生短刺毛；13. 鳞被；14. 雄蕊；15. 雌蕊。（邓盈丰绘）