

鞘早落，长圆形，长达 36 厘米，基部宽 7 厘米，背面密被红棕色刺毛，后者贴生不紧，易脱落，鞘顶端截平或近截平，边缘无毛；箨耳常不明显，鞘口缝毛长 1—2 毫米；箨舌高 1—2 毫米，边缘具长为 8—15 毫米的流苏状淡色刚毛；箨片呈线状披针形，先端内卷成针状，其长不超过箨鞘的一半，背面无毛，腹面密被贴生糙毛。小枝具 5—9 叶；叶鞘长 20—30 毫米，下部无毛，上部具隆起的纵肋，并在肋间被白色刺毛；叶耳常不明显，缝毛缺或可有数条，纤弱，淡色，长 5—7 毫米，平滑；叶片近无柄，线状披针形或披针形，长 5.5—15 厘米，宽 6—10 毫米，先端渐尖，基部圆形，上表面密被白色刺毛，下表面近无毛，叶缘亦无毛。花枝未见。

产海南。生于原生及次生林中。马来西亚也有分布。模式标本采自马来西亚。

竿节间可作吹火管用。

3. 筴箨竹 (台湾植物志)

Schizostachyum diffusum (Blanco) Merr. in Amer. Journ. Bot. **3**: 62. 1916; W. C. Lin in Bull. Taiwan. For. Res. Inst. No. **69**: 77. ff. 51, 52. 1961. et in ibid. No. **248**: 108. f. 50. 1974; H. L. Li, Woody Fl. Taiwan 912. 1963; Fl. Taiwan. **5**: 780. pl. 1519. 1978. — *Bambusa diffusa* Blanco, Fl. Filip. ed. 1. 269. 1837. — *Dinochloa diffusa* (Blanco) Merr. in Philip. Govt. Lab. Bur. Bull. **27**: 93. 1905.

竿纤细，攀援状，呈“之”字形弯曲，长达 40 米，粗 0.5—1.5 厘米；节间长 15—60 厘米，节下幼时被一圈白粉，壁厚 2—4 毫米；竿环平；箨环显著隆起；竿每节分枝多数，粗细相近。箨鞘脱落性，革质，坚硬，顶端下凹，背面被棕色刺毛，边缘被纤毛；箨耳不显著；鞘口缝毛显著发达，弯曲；箨舌极低矮或不明显；箨片外翻，呈线状披针形，先端内卷成针状。小枝具叶 5—12 枚；叶鞘长 5—12 厘米，无毛，外侧边缘具纤毛；叶耳不明显，缝毛发达，幼时白色，老时则变为棕色；叶舌半圆形或近截平，齿裂；叶柄短；叶片呈长圆状披针形，长 10—25 厘米，宽 1.5—2.5 厘米，先端急尖，基部圆形，边缘密被粗糙小刺毛，下表面无毛。假小穗长 1.8—2.8 厘米，直径 2—3 毫米，着生于具叶花枝之各节；苞片 2，长圆状披针形，长 10 毫米，无毛，具多脉；外稃卵状长圆形，长 14 毫米，宽 6 毫米，无毛，具多脉；内稃长 19 毫米，宽 6 毫米，顶端具 2 短裂，背部圆，无脊，具多脉；鳞被 2，椭圆状披针形，膜质；花丝长，花药长 9 毫米；雌蕊长 18 毫米，子房无毛，花柱长，柱头 3，短，羽毛状。颖果倒卵形，直径 2—4 毫米，无毛，顶端具宿存花柱。 笋期 5—8 月。

产台湾。广泛生于原生林中，在台湾岛东部和南部的分布海拔高度为 250—1 200 米。菲律宾也有分布。模式标本采自菲律宾。

种植供观赏用。

4. 山骨罗竹 (岭南科学杂志) 图版 3: 13—14

Schizostachyum hainanense Merr. ex McClure in Lingnan Sci. Journ. **14**: 591. pl.