

2 厘米,先端渐尖,基部圆形,上表面粗糙,被稀疏短刺毛,下表面近无毛,但在两表面均可见小横脉,上部叶缘具小锯齿。花枝未见。

产江西。模式标本采自寻乌。

7. 短枝黄金竹 (台湾植物志)

Schizostachyum brachycladum (Kurz) Kurz in Journ. Asiat. Soc. Beng. **39**(2): 89. pl. 6. 1870; Fl. Taiwan **5**: 778. pl. 1518. 1978. —— *Melocanna brachyclada* Kurz in Teysm. et Binn., Cat. Hort. Bogor. 20. 1866, nom. nud.

竿直立,高达13米。直径8厘米,尾梢近直立;节间长20—50厘米,绿色间有几条窄的淡黄色纵条纹或黄色间有几条窄的绿色纵条纹,初时被白粉,节下有白粉环,竿壁厚2—5毫米;分枝在竿每节为多数,彼此粗细相近。箨鞘通常存留较久,革质,硬脆,背面密被红棕色刺毛,边缘平滑;箨耳小,高25毫米,质脆,稍外翻,鞘口缝毛显著,长4—5毫米;箨舌高2毫米,光滑;箨片卵状三角形,背面无毛;腹面被柔毛。小枝具叶6—10片或更多;叶鞘无毛;叶耳小,具缝毛;叶舌突出,光滑;叶柄短;叶片长圆状披针形,长20—40厘米,宽3—7厘米,绿色,有时还可具几条黄白色的纵条纹,先端急尖,基部楔形或钝圆,下表面密被短柔毛,叶缘具小刺毛。假小穗通常着生于具叶花枝之各节,苞片2,广卵形,长3—5毫米,宽4—6毫米;小穗含小花1或2朵;外稃卵状披针形,长10—12毫米,具多脉;内稃长11—14毫米,亦具多脉,顶端2裂,具纤毛;鳞被3,卵形,透明,紫色,长4毫米,边缘被毛;花药紫色,长6毫米;雌蕊全长13毫米,子房卵形,无毛,花柱细,柱头3,羽毛状。果未见。

分布于热带亚洲。我国台湾有栽培,引自菲律宾。模式标本采自印度尼西亚爪哇岛。种植供观赏。

8. 篋箨竹 (南方草木状) 图版4: 15

Schizostachyum pseudolima McClure in Lingnan Sci. Journ. **19**: 537. 1941. et in Journ. Arn. Arb. **23**: 101. 1942; 中国主要植物图说·禾本科 82 页,图 55a, 55b, 1959; 海南植物志 **4**: 361. 1977; 云南树木图志下册, 1295 页,图 598. 1991. —— *S. lima* auct. non. Merr.; McClure in Lingnan Sci. Journ. **14**: 588. 1935.

竿直立或近直立,高达10米,直径4厘米,尾梢长下垂或作攀援状;节间直,圆筒形,基部光亮无毛,上部具硅质,初时还被有贴生的白色糙毛,节间极延长,可达60厘米,竿壁厚1—2毫米;竿环平;箨环突起;竿每节分枝多数,枝长50厘米,最长者可达1米。箨鞘迟落,草黄色,质硬而脆,背面具高起的纵肋,具硅质,被有贴生的白色糙毛,上部边缘被长为1—2毫米的纤毛,顶端截平;箨耳常不明显,鞘口缝毛多数,长10—18毫米;箨舌低矮,高1—1.5毫米,截平,边缘常具流苏状毛(毛长1—2毫米);箨片外翻,线状披针形,渐尖,边缘具细齿,长度常超过箨鞘的一半或三分之二,背面无毛,腹面基部密被长硬毛,其余部分具硅质,也多少被糙伏毛。小枝具6—8叶;叶鞘