

形，常外翻，背面被糙硬毛，腹面密生暗棕色小刺毛，先端渐尖具硬尖头，基部略作圆形收窄后即向两侧平展而成箨耳；箨片基部宽度约为箨鞘先端宽的 $2/5$ ，边缘近基部被纤毛。末级小枝具 5—9 叶，叶鞘肋纹隆起，背部的上方被短硬毛，外缘一侧被短纤毛；叶耳微小或缺，鞘口缝毛常不存在或有时仅 2—3 条波曲状短缝毛；叶舌近截形，低矮，边缘微齿裂并被细长纤毛；叶片线状披针形至狭披针形，长 10—20 厘米，宽 12—25 毫米，两表面均粗糙，近无毛，惟下表面的基部常被稍密的长柔毛，先端渐尖而具粗糙钻状尖头，基部近圆形或近截形。假小穗 2 至数枚簇生于花枝各节；小穗线形，带淡紫色，长 2.5—4 厘米，宽 3—4 毫米，含小花 4—12 朵，其中 2—5 朵为两性花；颖 2，长约 2 毫米，无毛；外稃卵状长圆形，长 6—9 毫米，宽 2.5—4 毫米，背面无毛，具 9—11 脉，先端尖，边缘无毛；内稃长约 7 毫米，宽约 1.8 毫米，具 2 脊，脊上密被纤毛，脊间具 3 脉，脊外亦各具 3 脉，先端呈二叉状；花丝分离，长 6—7 毫米，花药黄色，宽线形，长 3—4 毫米；子房瓶状，长 1.2—2 毫米，花柱短，柱头 3 分，羽毛状。 笋期 6—9 月，花期春季（但 11 月中旬亦可见开花）。

我国福建、台湾、广西、云南等省区均已栽培，多种植在海拔 300 米左右的河流两岸和村落周围。原产印度尼西亚（爪哇岛）和马来西亚东部，在菲律宾、泰国、越南均有栽培。模式标本采自爪哇岛。

本竹种常栽植为防护林；竹竿可作棚架用材。

2b. **惠方箨竹**（栽培型）（改拟） 林氏箨竹（台湾植物志）

cv. **Wei-fang Lin**

Bambusa blumeana J. A. et J. H. Schult. cv. *Wei-fang Lin* (W. C. Lin) Chia et al. in *Guihaia* **8** (2): 123. 1988. — *B. stenostachya* Hack. cv. *Wei-fan Lin* W. C. Lin in *Bull. Taiwan For. Res. Inst. No.* **98**: 12. f. 13, 1964; *Fl. Taiwan* **5**: 761. 1978.

竿和分枝的节间均为金黄色，后渐转为橙黄色而具深绿色纵条纹；箨箨淡绿色而具少数乳黄色纵条纹。

台湾北部栽培。模式标本采自台湾。

3. **小箨竹**（广东） 图版 12: 5

Bambusa flexuosa Munro in *Trans. Linn. Soc.* **26**: 101. 1968; 香港竹谱 34 页. 1985; 中国竹谱 19 页. 1988. — *B. stenostachya* auct. non Hack.; Merr., in *Lingnan Sci. Journ.* **5**: 26. 1927, p. p.; 广州植物志 772 页. 1956. — *B. bambos* auct. non (L.) Voss; *Fl. Hainan.* **4**: 354. 1977.

竿高 6—7 米，直径 3.5—6 厘米，尾梢略下弯，下部稍呈“之”字形曲折；节间长 20—30 厘米，幼时疏生棕色贴生刺毛，不久毛落后留有凹痕，节下方常环生一圈棕色绢毛，竿壁厚；节处稍隆起，仅于解箨后在箨环上留下一圈棕色脱落性短刺毛；分枝常自