

片 3—5 片, 狭三角形或近卵形, 无毛, 先端钝; 小穗含两性小花 6—12 朵; 小穗轴节间长 2—4 毫米, 远离内稃的一面圆拱而被白毛, 另一面则扁平而无毛, 顶端被短纤毛; 颖常缺; 外稃卵状长圆形, 长 5—9.5 毫米, 先端钝急尖或急尖具细尖头, 多脉; 内稃通常稍长于外稃, 具 2 脊, 脊上被短纤毛, 脊间 3—5 脉; 鳞被 3, 不相等, 倒卵形, 长约 1.4 毫米, 先端钝, 边缘密生纤毛; 花丝分离, 花药先端钝; 子房狭窄, 顶端增厚而被短硬毛, 花柱细长, 被短硬毛, 柱头 3 分, 羽毛状。 笋期 5—6 月, 花期 8—12 月。

本种分布较广, 产我国华南和西南地区, 多生于河流两岸和村落附近。模式标本采自广东番禺。

竹竿粗大而通直, 农村常用以建茅屋或用以作水车的盛水筒, 故有“车筒竹”之称。又因其竹丛基部形似密刺丛, 农村常种植于村落四周, 以作防篱之用; 又因其竹竿密集, 根系发达, 亦常种于河流两岸以作护堤防风之用。

5. 鸡婆箬竹 (广东)

Bambusa funghomii McClure in Lingnan Sci. Journ. **19** (4): 535. pl. 37. 1940; 广州植物志 744 页, 1956; 陈嵘, 中国树木分类学 (补编) 11 页, 1953; 中国主要植物图说·禾本科 51 页, 图 34, 1959; 广西竹种及其栽培 19 页, 图 10, 1987.

竿高 13—15 米, 直径 6—7 厘米, 尾梢近直立或稍下弯, 下部呈“之”字形强曲折; 节间长 25—32 厘米, 稍弯, 幼时无白蜡粉, 仅在竿下部的节间被成纵行排列的贴生的暗棕色小刺毛, 毛落后在竿表面留有凹痕, 竿壁厚 1—1.5 厘米; 节稍隆起, 无毛, 竿下部的节处可呈曲膝状; 分枝常自竿基部第一节开始具单枝, 至中上部各节则为 3 至多枝簇生, 竿下部分枝具锐利的硬刺, 并相互交织而成密刺丛。箨鞘迟落, 革质, 背面稍被白蜡粉, 在基部乃至近中部疏生暗棕色刺毛, 后变无毛, 干时纵肋隆起, 先端宽拱形, 边缘被白色短纤毛或近无毛; 箨耳发达, 极不相等, 卵状长圆形至卵状披针形, 具波状皱褶而向外鼓起, 两表面均被疏或密的糙硬毛, 边缘具长达 1 厘米的淡色波曲状繸毛; 箨舌高 5—7 毫米, 边缘齿裂或条裂, 被不等长的流苏状毛; 箨片直立或竿上部的外展, 卵状三角形至宽披针形, 背面无毛, 腹面脉间被暗棕色小刺毛, 先端渐尖而边缘强烈内卷, 基部近圆形收窄, 且其宽度约为箨鞘先端宽的 1/3 或稍更宽, 边缘下部呈波状皱褶并被短纤毛。叶鞘无毛或疏生短硬毛, 后变无毛; 叶耳常不存在, 鞘口繸毛数条, 细弱, 常呈波曲状; 叶舌极低矮, 截平或稍圆拱, 近全缘或具细齿, 有脱落性短纤毛; 叶片线状披针形, 长 6—15 厘米, 宽 6—16 毫米, 两面无毛或仅上表面近基部被短柔毛, 次脉 3—6 对, 有时嫩叶可于脉间具小横脉, 先端渐尖而具钻状尖头, 基部近心形或近圆形。花果未见。

产广东。生于丘陵旷地或村落附近。模式标本采自广州。

本种农家常种植以作防篱; 竿材坚实, 可作棚架、支柱等用。

6. 焕镛箬竹 (香港竹谱) 图版 13: 12

Bambusa chunii Chia et H. L. Fung in Kew Bull. **37** (4): 593. f. 2. 1983; 香港