

竿高 3—7 米，直径 1.5—4 厘米；节间长 21—27 厘米，无毛，幼时薄被白蜡粉，竿壁厚；分枝常自竿基部第一或第二节开始，每节 3 至数枝簇生，主枝较粗长，竿下部分枝上的小枝有时可短缩为弯曲硬刺。箨鞘早落，背面无毛，干时纵肋隆起，内侧边缘的顶端稍作圆弧形隆起，先端略向外侧一边倾斜，呈稍不对称的极宽的拱形或近斜截形；箨耳不相等，线状披针形或长圆形，宽不及 3 毫米，边缘具卷曲繸毛；箨舌高约 1 毫米，边缘呈不规则细齿裂；箨片直立，卵形至卵状披针形，背面无毛，腹面近基部略粗糙，先端渐尖，基部作圆形收窄，其宽度约为箨鞘先端宽的 $3/5$ 。叶鞘无毛，纵肋稍隆起，背部具脊；叶耳半圆形，边缘具数条波曲状繸毛；叶舌极低矮；叶片线状披针形至披针形，长 5—12 厘米，宽 8—17 毫米，上表面无毛，下表面密生短柔毛，先端渐尖具钻状尖头，基部近圆形或宽楔形。假小穗以数枚簇生于花枝各节，线状披针形至披针形，长 1.5—2 厘米；先出叶宽卵形至卵形，长 3—3.5 毫米，具 2 脊，脊上被短纤毛；具芽苞片 2 或 3 片，卵状椭圆形至卵状长圆形，长 3—3.5 毫米，先端钝至急尖，具极短的短尖头；小穗含小花 6 或 7 朵，中部的 3 或 4 朵为完全花；小穗轴节间形扁，长 2—3 毫米，顶端膨大呈杯状，且在其边缘被极短的纤毛；颖缺；外稃卵状长圆形，长 7.5—8 毫米，无毛，具 9—11 脉，先端急尖具短尖头；内稃线状披针形，略长于外稃，背部具 2 脊，脊间 4 脉，脊外每边各具 2 脉，近顶端处疏生极短的纤毛，并在先端具一簇白色画笔状毛；鳞被 3，不相等，边缘被长纤毛，前方 2 片偏斜，长 2 毫米，后方 1 片近倒卵形，长 1.2 毫米；花丝细长，花药长 4 毫米；子房卵形，长 0.4 毫米，顶端增厚并被短硬毛，基部具长 1 毫米的子房柄，花柱长 0.2 毫米，柱头 3 分，长 0.8 毫米，羽毛状。成熟颖果未见。

产海南。生于低丘陵地或村落附近。模式标本采自海南屯昌县枫木。

9. 坭箨竹 (广东) 箨竹、坭竹、猪𧄸脯 (广东)

Bambusa dissimulator McClure in Lingnan Sci. Journ. **19** (3): 413. pl. 20. 1940; 广州植物志 773 页; 陈嵘, 中国树木分类学 (补编) 11 页, 1953; 中国主要植物图说·禾本科 47 页, 图 32, 1959.

9a. 坭箨竹 (原变种)

var. *dissimulator*

竿高 10—18 米，直径 4—7 厘米，尾梢近直立或稍下弯，下部略呈“之”字形曲折；节间长 25—35 厘米，幼时薄被白蜡粉，通常无毛，有时竿基部数节间可具黄白色纵条纹，竿壁厚；节稍隆起，无毛，偶有基部一、二节生有短气根；分枝常自竿基部第一或第二节就开始分出单枝，上方各节则为 3 至数枝簇生，主枝较粗长，竿下部的分枝上常具硬或软的刺。箨鞘早落，革质，背面近无毛，或被不明显的糙硬毛。干时纵肋隆起，先端呈不对称的拱形；箨耳不相等，常有皱褶，边缘被波曲状繸毛，大耳长圆形至倒披针形，宽 4—5 毫米，小耳卵形至椭圆形，宽 3—4 毫米；箨舌高 5—7 毫米，边缘齿裂并条裂，被白色短流苏状毛；箨片直立，卵状三角形至卵状披针形，背面无毛，腹面于脉间被暗