

港竹谱 36 页. 1985.

笋高 10—12 米, 直径 5—7 厘米, 尾梢下弯, 下部稍呈“之”字形曲折; 节间略弯, 其下部稍有肿胀, 全长 40—47 厘米, 幼时薄被白蜡粉, 并疏被棕色贴生小刺毛, 毛脱落后在表面留有凹痕, 笋壁稍厚; 节稍隆起, 常于笋基第一至 2 节的箨环之上下方各环生一圈灰白色绢毛; 分枝常自笋基第一或第二节开始, 笋基部常为单枝, 中上部的各节则为数枝至多枝簇生, 主枝明显较粗长。箨鞘早落, 干时背面纵肋稍隆起, 近基部贴生以暗褐色刺毛, 先端近截形; 箨耳不相等, 沿箨鞘顶端两侧呈水平伸展, 边缘具波曲状繸毛, 大耳长圆形至狭长圆形, 长约 2 厘米, 宽 5—6 毫米, 小耳椭圆形, 其大小约为大耳的一半; 箨舌高 2—3 毫米, 边缘齿裂, 被短流苏状毛; 箨片直立, 狭卵形至卵状三角形, 长约为箨鞘全长的一半, 基部稍作圆形收窄后即与箨耳相连, 此相连部分约为 3 毫米, 箨片基部宽度约为箨鞘先端宽的 2/3, 边缘近基部被波曲状繸毛。叶鞘背面无毛, 外侧边缘被短纤毛; 叶耳卵形或镰刀形, 边缘具数条长 5—10 毫米的弯曲繸毛; 叶舌高 1 毫米, 先端圆拱, 边缘被短的纤毛; 叶片线状披针形至狭披针形, 长 10—20 厘米, 宽 1.3—2 厘米, 上表面无毛, 下表面密生短柔毛, 先端渐尖具钻状尖头, 基部近圆形或宽楔形。假小穗以数枚簇生于花枝各节, 稍扁, 线状披针形, 长 3—4 厘米; 先出叶宽卵形, 两脊于近顶端被短纤毛, 先端钝圆; 具芽苞片常 2 片, 宽卵形; 小穗含小花 5—7 朵, 其顶端 1—2 朵常不孕; 小穗轴节间形扁, 长 3—4 毫米, 顶端膨大而被微毛; 颖常 1 片, 卵形, 长 6—8 毫米, 多脉, 先端具短尖头; 外稃卵状椭圆形, 长 10—14 毫米, 无毛, 多脉, 先端急尖而具短尖头; 内稃稍长于外稃, 先端钝, 具 2 脊, 脊仅于近顶端疏生极短的白色纤毛, 或有时近于无毛, 脊间 6—7 脉, 脊外每边 3—4 脉; 鳞被 3, 不相等, 后方 1 片稍大, 倒卵形, 基部增厚, 边缘被细纤毛; 花丝短, 花药黄色, 先端钝; 子房卵形, 顶端被短硬毛, 花柱极短, 柱头 3, 羽毛状。

产广东及香港, 多栽培于广州市郊; 贵州三都县也有栽培。模式标本采自广州。

本种为广州近郊栽培的夏季笋用竹之一, 因其笋肉肥厚而味甘美, 被誉为鱼肚的脯肉, 故有鱼肚脯竹之称。笋材常用以搭瓜棚、晒架和制作农具之用。

41. 石竹仔 (海南)

Bambusa piscatorum McClure in Lingnan Univ. Sci. Bull. No. 9: 14. 1940 “piscaporum”; 海南植物志 4: 356 页. 1977.

笋高 6—10 米, 直径 2.5—3.5 厘米, 尾梢近直立; 节间长 50—60 厘米, 无毛, 幼时薄被白蜡粉, 尤以节下方为甚, 笋壁较薄; 节处不隆起, 笋基部第一、二节于箨环之上下方环生一圈灰白色绢毛, 惟生于箨环之下方的毛环仅限于第一节; 分枝常自笋的第四至六节开始, 以多枝簇生, 中央 1 枝略较粗长。箨鞘早落, 厚革质, 坚脆, 背面平滑无毛, 略有光泽, 先端呈不对称的拱形; 箨耳不相等, 微皱, 其末端钝形, 边缘密生脱落性弯曲繸毛, 大耳倒披针形, 长约 1.5 厘米, 宽约 5 毫米, 小耳常为箨片基部所挤压

而皱缩以致不成形，或为倒狭卵形，其大小约为大耳的 $2/5$ ；箨舌高 2—3 毫米，边缘齿裂，被短流苏状毛或无毛；箨片直立，不易脱落，呈不对称的卵状三角形至卵状狭三角形，先端渐尖具钻状尖头，基部稍作圆形收窄后即与箨耳相连，此相连部分约为 5 毫米，箨片基部宽度约为箨鞘先端宽的 $4/5$ 。叶鞘被短硬毛，纵肋隆起；叶耳狭卵形至镰刀形，边缘具少数放射状细缝毛；叶舌高约 1 毫米，先端圆拱形，近全缘；叶片线状披针形至披针形，长 8—16 (20) 厘米，宽 12—16 (20) 毫米，上表面无毛，下表面密生长柔毛，先端渐尖而具钻状细尖头，基部近圆形或楔形。花果未见。

产海南。生于村落附近。模式标本采自海南文昌。

全竿通直而光滑，尾梢渐细，当地用作钓鱼竿。

本种与后述的黄竹仔 *B. mutabilis* McClure 极为相似，但主要区分特征在于本种的箨鞘较为厚实，质坚脆；小的箨耳常为箨片基部所挤压，而不是由箨片基部作部分掩盖，大耳倒披针形，小耳倒狭卵形，两者的末端均为钝形，而非近圆形；箨片不易脱落，呈不对称的卵状三角形至卵状狭三角形，其基部稍作圆形收窄，而非近心形收窄。

42. 花竹 (福建) 火管竹、火广竹、火吹竹 (台湾)，绿篱竹 (广东)

Bambusa albo-lineata Chia in *Guihaia* 8 (2): 121. 1988. — *B. textilis* McClure var. *albo-striata* McClure in *Lingnan Univ. Sci. Bull.* No. 9: 15. 1940. non *B. albo-striata* Hort. ex Lavallée 1877. — *B. dolichomerithalla* Hayata, *Icon. Pl. Form.* 6: 146. f. 55. 1916, p. p. (“merithallium ...albo-striatum, vagina...sparse hirsuta” et f. 55. quoad vaginam culmi); W. C. Lin in *Quart. Journ. Chin. For.* 3 (2): 45. 1967, et in *Bull. Taiwan For. Res. Inst.* No. 248: 59. f. 26. 1974; *Fl. Taiwan* 5: 751. pl. 1504. 1978, p. p. — *Leleba dolichomerithalla* (Hayata) Nakai in *Journ. Jap. Bot.* 9: 16. 1933, p. p.; W. C. Lin. in *Bull. Taiwan For. Res. Inst.* No. 69: 29, ff. 13, 14. 1961, p. p.

竿高 6—8 米，直径 3.5—5.5 厘米，尾梢下弯；节间长 40—60 (80) 厘米，竿壁稍薄，竿下部第一至第四节间甚至第六节间具黄白色纵条纹；节处不隆起，第一至四节常于箨环之上方环生一圈灰白色绢毛；分枝常自竿的第四至六节开始，多枝簇生，主枝稍粗长。箨鞘早落，革质，质脆，背面具黄白色纵条纹，并于两侧疏被暗棕色贴生刺毛，此刺毛以内侧被遮盖的一边较密，而外侧露出一边则极疏或有时近于无毛，竿基部第一和第二节上的竿箨之箨鞘背面于下半部密被毛，先端稍呈不对称的拱形或作浅波状起伏；箨耳不相等，微皱，边缘仅于近末端处被有少许粗而短的缝毛，大耳长圆形或近倒披针形，长 1.5 厘米，宽 5—7 毫米，小耳常与箨片基部相连并无明显分界线，如分离时则为长圆状倒披针形，其大小约为大耳的 $1/3$ — $1/2$ ；箨舌高 1—1.5 毫米，边缘短齿裂，具极短的流苏状毛；箨片直立，呈不对称的卵形至卵状狭三角形，位于竿下部的竿箨者常具黄白色纵条纹，先端渐尖具硬尖头，基部稍作圆形收窄后即与两侧箨耳相连，此相连部