

产江西、福建、台湾、广东、广西。常栽培于江河两岸及村落附近。模式标本采自台湾。

本种竿的节间长而材质柔韧。为编制各种竹器的优良用材。

45b. 长毛米筛竹 (变种) (拟) 长毛八芝兰竹 (台湾竹科植物分类之研究) 图版 25: 15, 16

var. *hirsutissima* (Odashima) W. C. Lin in Bull. Taiwan For. Inst. No. **98**: 21. 1964; Fl. Taiwan **5**: 759. 1978; Chia et al. Guihaia **8** (2): 126. 1988. — *Leleba beisitiku* Odashima var. *hirsutissima* Odashima in Journ. Soc. Trop. Agr. **8** (1): 58. f. 3. 1936. — *Bambusa textilis* McClure var. *fusca* McClure in Lingnan Univ. Sci. Bull. No. **9**: 16. 1940. — *Leleba pachinensis* (Hayata) Nakai var. *hirsutissima* (Odashima) W. C. Lin in l. c. No. **69**: 61. f. 28, 29. 1961; H. L. Li, Woody Fl. Taiwan 908. 1963.

本变种与原变种的主要区别特征在于箨舌具流苏状长毛，后者长达 5—10 毫米，原变种的箨舌仅作不规则齿裂。

产福建、浙江、台湾、广东、广西。多栽培于低丘陵地，尤以村落附近为多。模式标本采自台湾。


竿为编制各种竹器的较好用材。

据小田岛喜次郎 (K. Odashima) 的原始记载，本变种的叶鞘上部贴生极多长硬毛，其毛宿存或早落。但我们所见福建、浙江、广东、广西的标本，其叶鞘上均无毛，现仍暂用作本变种的名称。

46. 藤枝竹 (福建)

Bambusa lenta Chia in Guihaia **8** (2): 57. 1988.

竿高 5—10 米，直径 4—4.5 厘米，尾梢略下弯；节间长 35—50 厘米，幼时被白蜡粉和暗棕色贴生小刺毛，竿壁稍薄，下部各节间由于其基部相互在不同之一侧偏肿，致使竿下部略呈之字形曲折；节处不隆起，竿下部的第 1—3 节于箨环之上方环生一圈灰白色绢毛，箨环之下于幼时环被一圈白蜡粉，或有时也环生一圈灰白色绢毛；分枝常自竿下部第八节至第十节才开始，多枝簇生，主枝稍较粗长。箨鞘早落，革质，质脆，背面常于近内缘一侧疏被暗棕色贴生刺毛，先端向外缘一侧略为倾斜，以致呈近于截平的极宽拱形；箨耳不相等，稍皱，略向上斜升，边缘具波曲状细缝毛，大耳近长圆形，长 8 毫米，宽 6 毫米，其末端伸出于箨鞘边缘之外，小耳近椭圆形，常为其箨片基部作部分掩盖，其大小约为大耳的 1/3—1/4；箨舌高 2—3 毫米，细齿裂，两侧被短流苏状毛；箨片直立，略呈不对称的三角形至狭三角形，背面无毛，腹面粗糙，基部作圆形收窄后即与箨耳相连，此相连部分一般为 2—3 毫米，箨片基部宽度约为箨鞘先端宽的 3/4。叶鞘无毛，背具中脊，纵肋隆起；叶耳狭卵形至镰刀形，边缘具长缝毛；叶舌圆拱，极矮，边



图版 25 1—14. 米筛竹 *Bambusa pachinensis* Hayata var. *pachinensis*: 1. 竿箨背面观; 2. 竿箨腹面观; 3. 叶枝; 4. 花枝; 5. 先出叶; 6. 苞片; 7. 颖; 8. 外稃; 9. 内稃及小穗轴节间; 10. 内稃顶端放大观; 11. 鳞被; 12. 雄蕊; 13. 花药顶端放大观; 14. 雌蕊。15, 16. 长毛米筛竹 *Bambusa pachinensis* Hayata var. *hirsutissima* (Odashima) W. C. Lin: 15. 竿箨背面观; 16. 竿箨腹面观。

(邓盈丰绘)