

50j. 小叶琴丝竹 (栽培型) (拟)

cv. *Stripestem Fernleaf*

Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. cv. *Stripestem Fernleaf* R. A. Young in US-DA Agr. Handb. No. 193; 41. 1961; Fl. Taiwan 5; 757. 1978. — *B. nana* Roxb. var. *typica* Makino ex Tsuboi f. *viridi-striata* Makino ex Tsuboi, Ill. Jap. Sp. Bamb. ed. 2; 44. pl. 45. 1916. — *B. nana* f. *viridi-striata* Makino in Journ. Jap. 1; 28. 1917. — *B. floribunda* (Büse) Zoll. et Maur. ex Steud. f. *viridi-striata* Nakai in Riko Kyoiku (理科教育) 15; 66. 1932. — *Leleba floribunda* (Büse) Nakai f. *viridi-striata* Nakai in Journ. Jap. Bot. 9; 12. 1933. — *Bambusa multiplex* var. *stripestem fernleaf* R. A. Young in Nat'l. Hort. Mag. 25; 261. 1946. — *B. multiplex* var. *elagans* (Koidz.) Muroi f. *viridi-striata* (Makino ex Tsuboi) Muroi ex Sugimoto, New Keys Jap. Trees 457. 1961. — *B. glaucescens* (Willd.) Sieb. ex Munro cv. *Stripestem Fernleaf* (R. A. Young) Chia et But in Phytologia 52 (4); 259. 1982.

本栽培型与凤尾竹 *B. multiplex* cv. *Fernleaf* 相似, 其不同处在于植株较矮小, 高 1—3 米, 竿初时色淡红, 后转为黄色并具不同宽度的绿色纵条纹, 小枝下弯, 具 12—20 叶, 叶片长 1.6—3.8 厘米。

台湾和香港的庭园中有栽培。

种植于庭园中供观赏。

亚属 3. 单竹亚属 Subgen. *Lingnania* (McClure) Chia et H. L. Fung in Act. Phytotax. Sin. 18(2); 213. 1980. — Gen. *Lingnania* McClure in Lingnan. Univ. Sci. Bull. No. 9; 35. 1940.

竿无刺; 节间甚修长 (一般在 30 厘米以上, 模式种可长达 110 厘米), 竿壁薄 (常不及 8 毫米); 同一节的分枝常彼此近同粗, 亦有主枝较粗壮者; 箨鞘顶端甚宽, 而箨片基底宽仅及其 1/2—1/3 (或偶可宽至 2/3)。假小穗多呈紫褐色或古铜色。

模式种: 粉单竹 *Bambusa chungii* McClure 原产广西宜山。

本亚属约有 10 余种, 产我国南部平原或丘陵地区, 广栽培。越南亦有分布。由于收集材料不全, 现暂列下述 11 种。

分种检索表

1. 主枝较侧枝粗而长; 竿壁厚度常超过 0.8 厘米。
2. 竿壁厚达 1.5—2 厘米。
3. 幼竿的节间微被白粉和稀疏易落的白色小刺毛; 箨片背面无毛

- 51. 绵竹 *B. intermedia* Hsueh et Yi
3. 幼笋的节间无白粉, 但被有细柔毛; 箨片两面均生细刺毛和柔毛
- 52. 木簕竹 *B. wenchouensis* (Wen) Q. H. Dai
2. 笋壁厚在 1 厘米以下。
4. 幼笋节间的毛褐色, 聚成纵向条纹状; 箨环无毛; 箨片反折
- 53. 甲竹 *B. remotiflora* Kuntze
4. 幼笋节间的毛苍白色, 稀疏散生; 箨环具刺毛环; 箨片直立
- 54. 油竹 *B. surrecta* (Q. H. Dai) Q. H. Dai
1. 主枝与侧枝粗细相近; 笋壁较薄, 厚度在 0.8 厘米以下。
5. 笋梢攀援状以倚附他物 61. 藤单竹 *B. hainanensis* Chia et H. L. Fung
5. 笋梢劲直或弯曲但不倚附他物。
6. 幼笋无毛, 但显著有白粉。
7. 幼笋的箨环无毛; 箨鞘背面遍布宿存性短硬毛; 箨片腹面无毛
- 55. 单竹 *B. cerosissima* McClure
7. 幼笋箨环生有向下的刺毛; 箨鞘背面除基部具有宿存性的长柔毛外, 其余各处的毛均易脱落而变为无毛 (尤以箨鞘上部者如此); 箨片腹面被有小刺毛
- 56. 粉单竹 *B. chungii* McClure
6. 幼笋节间有毛 (如无毛则箨片直立), 无白粉或被白粉。
8. 幼笋节间被白粉及小刺毛, 刺毛脱落后则在笋表面留有小凹痕。
9. 箨鞘背面无毛或于背面之中部无毛, 无白粉; 箨耳明显存在
- 57. 青皮竹 *B. textilis* McClure
9. 箨鞘背面有刺毛, 且于幼时被白粉
- 58. 料慈竹 *B. distegia* (Keng et Keng f.) Chia et H. L. Fung
8. 幼笋节间无白粉, 或仅节下有白粉, 有疣基小刺毛, 刺毛脱落后留有小凹痕, 还有小斑点。
10. 箨片反折; 箨鞘先端截平或稍凹陷, 两侧近相等
- 59. 桂单竹 *B. guangxiensis* Chia et H. L. Fung
10. 箨片直立; 箨鞘先端深凹陷, 其一肩高耸, 故两侧很不对称
- 60. 水单竹 *B. papillata* (Q. H. Dai) Q. H. Dai
51. 绵竹 (云南澄江) 凤尾竹、芒竹、蛮竹 (云南俗名)

Bambusa intermedia Hsueh et Yi in Journ. Bamb. Res. 3 (1): 43. f. 1. 1984; 云南树木图志下册, 1380 页, 图 645. 1991.

笋直立, 高 7—10 (15) 米, 梢部劲直; 节间圆筒形, 长 35—45 (55) 厘米, 幼时深绿色, 有时具紫褐色纵条纹, 微被白粉及稀疏易落的白色小刺毛, 笋壁厚, 通常可达 2 厘米; 笋环平坦; 箨环隆起, 被柔毛, 常有鞘基残留物; 节内被白色绒毛; 分枝习性低, 以多枝簇生, 主枝粗长。箨鞘脱落性, 短于节间, 背面被黄、棕二色的小刺毛, 顶端微凹或略呈拱形, 箨耳不明显, 鞘口缝毛多数; 箨舌高 2—3 毫米, 顶端齿裂, 边缘缝毛长 5—15 毫米; 箨片外翻或直立, 卵状披针形, 先端渐尖, 基部收缩呈圆形, 宽为箨鞘顶端