

的1/3,腹面纵脉间密被微毛及小刺毛。末级小枝通常具5—12叶;叶鞘无毛;叶耳长卵形,鞘口缝毛弯曲;叶舌截平;叶片长7—18厘米,宽1—2.5厘米,下表面灰绿色有微毛。假小穗长2—4厘米,枯草色,微扁,苞片数片,光亮,自下而上逐渐增大,常具腋芽;小穗含小花7—11朵;小穗轴被毛,具关节,成熟后易折断;外稃长7—10毫米,先端具刺尖,背面无毛;内稃长于外稃,背面和脊上均无毛,顶端钝尖,无毛或具笔毫状微毛;鳞被3;花药长4.5毫米,先端钝;子房上部被白色长柔毛,具柄,柱头3,羽毛状。笋期5月。

分布在云南中部和南部,栽培较广,亦见于四川、贵州局部地区。模式标本采自云南澄江。

本种竿壁较厚,除可用于劈篾编结竹器外,亦宜用作建筑材料。


52. 木簕竹 (李衍竹谱详录)、毛单竹 (浙江温州)、王竹、大木竹 (均浙江平阳)、九层脑 (福建福鼎) 图版 27: 5

Bambusa wenchouensis (Wen) Q. H. Dai, comb. nov. — *Lingnania wenchouensis* Wen in Journ. Bamb. Res. 1 (1): 32. f. 9. 1982.

竿直立,高达12—16米,梢部弯曲;节间圆筒形,长37—50厘米,直径8—10厘米,幼时被细柔毛,竿壁厚16—20毫米;节内被绒毛,以后变为秃净;竿环不明显;箨环隆起,附有宽达15毫米的箨鞘残留物;分枝习性低,以多枝簇生,主枝粗长。箨鞘脱落性,革质,新鲜时灰绿色,长20—25厘米,基底宽20—25厘米,先端凹陷,背面被褐色刺毛;箨耳长而窄,横卧于箨鞘两肩,鞘口缝毛呈褐色,长约5毫米;箨舌高2毫米,随箨鞘口部作波状起伏,先端细齿裂,边缘无毛或附有纤毛;箨片强烈外翻,披针形,长6—9厘米,宽13—30毫米,先端渐尖,基部收窄呈钝圆形,为箨鞘顶端宽的1/3,两表面均具细绒毛,并在纵脉之间有刺毛,边缘生纤毛。末级小枝具7—12叶;叶鞘长40—45毫米,背面具细柔毛或无毛,纵肋隆起;叶耳发达,卵状,脱落性,边缘有缝毛;叶舌隆起呈卵形;叶柄长2毫米,无毛;叶片广披针形,长9—16厘米,宽12—20毫米,先端尖锐,基部钝圆,两边缘均具细锯齿,下表面全部具细绒毛,次脉6—7对,小横脉不明显。花枝无叶。假小穗作穗状排列于花枝上,长椭圆形,长达33毫米,颖2—4片,小穗具9—13朵小花;小穗轴近无毛,逐节脱落,向上逐渐增大;外稃长8毫米,先端急尖,无毛,具13—15脉;内稃较长于其外稃,具2脊,先端渐尖,脊间具5脉,脊外至边缘各具2脉,无毛;鳞被匙状或卵状,先端有纤毛;花药先端钝圆,基部箭簇状,纵裂开,长6毫米,花丝短,长约1毫米;子房椭圆形,长1毫米,先端有微毛,柱头3,羽毛状,长3毫米。

产浙江、福建。模式标本采自浙江温州中山公园后山边。

此竹高大,壁厚达16—20毫米,可劈篾多层,用以编制农具及海上捕捞用的缆索;笋味微苦,性凉,水漂后仍可食用。



图版 27 1—4. 甲竹 *Bambusa remotiflora* Kuntze: 1. 竿的一段, 示被毛及分枝情况; 2. 叶枝; 3. 竿箨背面观; 4. 竿箨顶端的腹面观。5. 木簕竹 *Bambusa wenchouensis* (Wen) Q. H. Dai; 竿箨顶端的背面观。6—8. 油竹 *Bambusa surrecta* (Q. H. Dai) Q. H. Dai: 6. 竿节, 示分枝; 7. 竿箨顶端背面观; 8. 竿箨顶端腹面观。(黄应钦绘)