

竿形特殊，庭园栽培供观赏。

6c. 美浓麻竹（台湾）（栽培型）

cv. *Mei-nung*

*Dendrocalamus latiflorus* Munro cv. *Mei-nung* W. C. Lin in Bull. Taiwan For. Res. Inst. No. 98: 10. f. 6. 1964, et. in Quart. Journ. Chin. For. 3 (2): 51. 1967; Fl. Taiwan 5: 776. 1978.

本栽培型与原栽培型很接近，但以竿与枝条均为黄绿色而在节间夹杂有深绿色纵长的细条纹，以及箨鞘为黄绿至棕绿色，其上亦有数条纵行的淡黄色细条纹，与之不同。

台湾省从南到北许多地方都有普遍栽培，大陆各地亦未有报道。模式标本采自高雄美浓。

与原栽培型有同样的广泛用途，而且笋亦味美可食。

上述麻竹的两栽培型在我国大陆尚未发现，其内容均是录自《台湾植物志》，以备参考。

7. 建水龙竹（竹子研究汇刊） 红竹（云南建水）

*Dendrocalamus jianshuiensis* Hsueh et D. Z. Li in Journ. Bamb. Res. 7 (4): 14. pl. 4. 1988; 云南树木图志下册，1399 页，图 654，1991.

竿高 17—18 米，直径 10—12 厘米，梢端下垂；节间长 25—37 厘米，幼时被白粉及小刺毛，壁厚 1.2—2 厘米；节内长 6 毫米；竿自第八、九节开始分枝，主枝 1，发达，长 1.5 米。箨鞘早落性，厚革质，与其节间近等长，先端截形或在中央略隆起，鞘口宽 6—11 厘米；箨耳较小，长 0.5—2 厘米，宽 1 毫米；箨舌高 1—4 毫米，边缘具细齿裂；箨片外翻，长 10—20 厘米，宽 3.5—7.5 厘米，腹面被有淡棕色小刺毛。末级小枝具 9 叶；叶鞘无毛；鞘口缝毛直立，计数条；叶舌高 2 毫米；叶片长 20—38 厘米，宽 3.5—8.5 厘米，次脉 9—13 对。花枝无叶，其节间长 2.2—7.5 厘米，一面具沟槽，全体密被银白色至淡黄褐色绒毛，每节着生 1 至数枚假小穗；小穗长 1—1.8 厘米，宽 0.5—1 厘米，先端钝，含小花 6 或 7 朵，棕褐色而带紫色，成熟时小花之间能疏离而各花张开；颖 1—3 片，长宽均为 5—8 毫米，背面生微毛，先端具小尖头；外稃与颖相类似，长 7—12 毫米，宽 5—10 毫米；内稃长 6—9 毫米，背部具 2 脊，脊间宽毫米，其间具 3 或 4 脉，先端有凹缺并带紫色；鳞被无或有时具一片退化鳞被，其长为 1 毫米；花丝长 1—1.4 厘米，花药黄色，长 4—6 毫米，花药隔先端伸出而锐尖；雌蕊长 1—1.5 厘米，全体被毛茸，柱头单一。果实未见。

产云南建水及元阳。模式标本采自建水县渣腊，黄草坝。

本种与麻竹 *D. latiflorus* Munro 近缘，但竿的节间幼时贴生小刺毛，箨鞘先端截形而鞘口较宽，叶鞘有鞘口缝毛；花枝节间具银白色至淡黄褐色绒毛以及小穗较窄等特征有所不同。