

竿高约 8 米，直径 4—6 厘米，梢端下垂；节间长 25—30 厘米，近于无毛，幼时被厚白粉，竿下部各节和节的下方均环生一圈棕色绢毛而无气根；分枝常自竿的第十节左右开始，以数枝簇生，主枝较粗长，在竿下部的分枝稍向下弯曲。箨鞘早落性，背面密被暗棕色贴生的小刺毛，近内侧边缘常有数条黄白色纵条纹，干时背面肋纹常不明显；箨耳缺或甚小，存在时为椭圆形至长圆形，或有时为窄倒卵形，长约 2 毫米，宽约 1 毫米，边缘生有细缝毛；箨舌高约 4 毫米，先端作宽弧形拱起，边缘被流苏状短毛，长约 1—2 毫米；箨片外翻，披针形，基部两侧向外延伸成一细窄条与箨耳相连。末级小枝具 5—7 叶；叶鞘无毛；叶耳常缺；叶舌高约 1 毫米，先端近呈圆弧形，边缘具细齿裂；叶片披针形至长圆状披针形，长 13—20 厘米，宽 25—33 毫米，两面无毛。花果未见。

香港和广东广州有栽培。模式标本采自香港。

竹竿劈篾可以编织各种竹器。

17. 荔波吊竹 (竹子研究汇刊) 吊竹 (贵州荔波)

Dendrocalamus liboensis Hsueh et D. Z. Li in Journ. Bamb. Res. 8 (1): 37. pl. 10. 1989.

竿高 12—15 米，直径 6—9 厘米，梢端下垂；节间长 32—36 厘米，幼时密被淡褐色小刺毛和白粉，竿壁厚 8—13.5 毫米；节内长 6—8 毫米，在其间及各节下方均具一圈绒毛环；分枝始于竿的第六或七节，竿每节生多枝，主枝 1，发达，长 3—5 米。箨鞘早落性，革质，背部贴生棕黑色刺毛，先端鞘口宽 3—5 厘米；箨耳波状皱缩，宽 2 毫米，其上具长为 0.5—1 厘米的缝毛，箨舌高 2—3 毫米，先端具流苏状长缝毛；后者长 1.5—2 厘米；箨片外翻，长 12 厘米，宽 1.5 厘米，腹面被小刺毛，基部向内收窄，其宽度为箨鞘口部宽的 1/3。末级小枝具 3—9 叶；叶鞘无毛；叶耳无；叶舌高 1 毫米；叶片的大小有变化，其长可在 8—40 厘米和宽在 1.5—8.5 厘米之间变化，次脉 6—14 对。花果未见。

特产于贵州荔波县城关 (模式标本产地)。

本种外形颇似黔竹 *D. tsiangii* (McClure) Chia et H. L. Fung，但本种竿型较大 (高 12—15 米，直径 6—9 厘米)，节间幼时密被小刺毛以及白粉，竿壁较厚，箨耳和箨舌两者均具缝毛，其长分别为 0.5—1 与 1.5—2 厘米，可以区别。

18. 冕宁慈 (云南西南林学院学报) 图版 45: 4—6

Dendrocalamus mianningensis Q. Li et X. Jiang in Journ. S. W. For. Coll. 1984 (1): 134 et. f. 1984; ex Hsueh et D. Z. Li, in Journ. Bamb. Res. 8 (1): 36. 1989.

竿高 4—8 米，直径 1.5 厘米，基部节间略作“之”字形曲折，梢端细长而下垂；节间长 22.5—27 厘米，光滑无毛，幼时被白粉，竿壁厚 3—6 毫米；箨环上有一圈箨鞘基部残余的木栓质环；竿每节分多枝，主枝明显。箨鞘迟落乃至宿存，革质，长三角形，背面被白粉和密被紫褐色小刺毛，此外还有不规则大小不等的褐色斑点，边缘两侧在中部以上具梳齿状丝质长毛茸，丝毛长约 1 厘米；箨鞘先端的鞘口具长缝毛；箨耳缺；箨舌