

色细柔毛，尤以近基部较密，先端边缘有短纤毛；箨片近锥形至披针形，直立，不皱褶，无毛，先端渐尖，基部向内收窄，其宽为箨鞘先端宽的 $1/3$ ，具多脉。竿每节分 3 枝，枝的节间扁平至半圆筒形。末级小枝具 2—4 叶；叶鞘无毛，边缘有纤毛，先端具细柔毛，鞘口缝毛数条，纤细，长达 7—8 毫米，直立，先端屈曲；叶耳缺或不明显，存在时呈卵形；叶舌高 1 毫米许，先端呈卵状突出，被黄褐色糙毛；叶片披针形至狭披针形，长 5—8 厘米，宽 7—10 毫米，基部急收缩，先端渐尖延伸，具锐尖头，两边缘均具锯齿，无毛，小横脉明显；叶柄长 1—2 毫米。花枝穗状侧生，具 1—3 枚假小穗，有苞片 2—5，具 7—9 脉；假小穗长 9 厘米许，宽 2—3 毫米；苞片 2，11—13 脉，包藏有先出叶与腋芽；先出叶近革质，无毛，具 2 脊；小穗含 11 朵小花；小穗轴略曲折，无毛；外稃具 15 脉，与小横脉构成长方形网格，无毛，先端急尖，呈锥状延伸；内稃较外稃为短，先端钝圆，脊上有纤毛疏生，脊间具五脉，两侧至边缘各具 2 脉；雄蕊通常 3 枚，偶见 2 枚，花药黄色，长 4—6 毫米，先端钝圆或开裂；鳞被 3，后方的一片较厚而短，上半部菱形，另 2 鳞被则较薄较长，具 7 脉，脉近平行，边缘与先端生白色纤毛；子房棒状，无毛，基部收缩成柄，全长 1.5—2 毫米，花柱甚短，长 0.3 毫米，柱头 3，长 3 毫米，被白色细毛。

产广东。模式标本产地不详。

本种的原记载缺竿高和直径等数据，是标本材料不全和采集野外记录漏记所致，有待进一步查考。

8. 糙耳唐竹 (竹子研究汇刊) 图版 62: 8—10

Sinobambusa scabrida Wen in Journ. Bamb. Res. 2 (1) 61. pl. 13. 1983.

竿高 5 米，径粗 15—20 毫米，幼时被白粉，在节内与节下方白粉特厚；节间无毛，有纵肋，在近分枝处即扁平并向上延续；箨环木栓质，初具棕褐色刚毛；竿环十分隆起，呈脊状；节内长 4—6 毫米。箨鞘厚革质，三角形，背部初被褐色刺毛，刺毛脱落后即留下较深的小凹痕，基部密生褐色刚毛；箨耳中度的伸出，长椭圆形，深褐色，被褐色糙毛，边缘具长缝毛；箨舌先端呈拱形，边缘生短纤毛；箨片披针形至阔披针形，直立，坚硬无毛，具纵脉，先端渐尖，基部向内收窄。竿每节分 3 枝。末级小枝具 3—4 叶；叶鞘长 40—45 毫米，全部无毛；叶耳与鞘口缝毛不存；叶舌短，截形，无毛；叶片披针形至狭披针形，长 8—11 厘米，宽 11—18 毫米，基部钝圆，先端渐尖或急尖延伸，两侧不对称，无毛，一边缘有小锯齿，次脉 4 或 5 对，小横脉明显。花枝未见。 冬季出笋。

迄今仅限于广西凌东觉金乡青龙山有分布 (模式标本产地)。

9. 花箨唐竹 (竹子研究汇刊) 图版 58: 6, 7

Sinobambusa striata Wen in Journ. Bamb. Res. 2 (1): 63. pl. 16. 1983.

竿高达 10 米许，直径 5—6 厘米，幼竿绿色，除节下方具白粉外，其余各处均无白粉，被直立短刺毛，老竿无毛，竿髓海绵状；节间长达 65 厘米，分枝以下的节间圆柱状，近分枝处则一侧扁平并向上延续；箨环木栓质，初具褐色粗毛；竿环隆突，与箨环近同



图版 62 1—7. 毛环唐竹 *Sinobambusa incana* Wen; 1. 花枝; 2. 外稃; 3. 内稃; 4. 鳞被; 5. 雄蕊; 6. 雌蕊; 7. 竿箨上端。8—10. 糙耳唐竹 *Sinobambusa scabrida* Wen; 8. 竿的一部分, 示分枝; 9. 竿箨; 10. 叶枝。11. 红舌唐竹 *Sinobambusa rubroligula* McClure 的竿箨。(赵南先绘, 仿许基衍)