端拱形，边缘生极短的白色纤毛；叶片带状披针形，长 7.5—9.5 厘米，宽 8—11 毫米。，两面近于无毛，惟下表面基部于中脉两侧具长柔毛 笋期 4 月。

产湖南长沙。模式标本采自长沙，系栽培于湖南省林业科学研究所竹园，但自何处引入已无法考证。

6. **灰竹**（江苏植物志） 净竹（华东禾本科植物志），石竹（江苏、浙江）

**Phyllostachys nuda** McClure in Journ. Wash. Acad. Sci. **35**: 288. f. 2. 1945. et in Agr. Handb. USDA No. **114**: 48. ff. 36, 37. 1957; 华东禾本科植物志 309 页. 图 333. 1962; 江苏植物志，上册 157 页. 图 246. 1977; Fl. Taiwan **5**: 730. pl. 1494. 1978; 中国竹谱 75 页. 1988. ——*P. nuda* f. *lucida* Wen in Bull. Bot. Res. **2** (1): 75. 1982.

6a. **灰竹**（原栽培型） 图版 68：1—5

cv. **Nuda**

竿高 6—9 米，粗 2—4 厘米，劲直或常于基部呈“之”字形曲折，幼竿深绿色，被白粉，节处常为暗紫色，节下方有暗紫色晕斑，无毛，老竿灰绿色至灰白色；节间长达 30 厘米，有纵肋，竿壁厚，为竿粗的 1/2—1/3；竿环强烈隆起，高于稍隆起的箨环。箨鞘背面为淡绿紫色或淡红褐色，具紫色纵脉纹和紫褐色斑块，尤以箨鞘的上部为常见，被白粉，因脉间有微疣基刺毛而微粗糙；无箨耳及鞘口缝毛；箨舌黄绿色，狭而高，其高约 4 毫米，顶端截形，边缘生短纤毛；箨片绿色，另有紫色纵脉纹，狭三角形至带状，外翻，幼时微皱曲，以后平直。末级小枝具 2—4 叶，无叶耳及鞘口缝毛；叶片披针形至带状披针形，长 8—16 厘米。花枝呈穗状，长 5—9 厘米，基部有 3—5 片逐渐增大的鳞片状苞片；佛焰苞 5—7 片，边缘生柔毛，无叶耳及鞘口缝毛，缩小叶小，卵状披针形至锥状，每苞腋有 2 或 3 枚假小穗，基部的 1 或 2 片佛焰苞常不孕而早落。小穗含 1 或 2 朵小花，长 2.7—3.5 厘米，狭披针形；小穗轴最后延伸成针状，节间密生短柔毛；颖不存在或为 1 片；外稃长 2.5—3 厘米，无毛或仅边缘疏生短柔毛；内稃长 2—2.5 厘米，通常无毛；鳞被 3，长约 4 毫米；花药长约 1 厘米；柱头 2 或 3，羽毛状。 笋期 4—5 月，花期 5 月。

产陕西、江苏、安徽、浙江、江西、台湾及湖南。1908 年由浙江余杭县塘栖引入美国栽培。模式标本采自美国。

笋质优良，壳薄肉厚，俗称“石笋”，是加工天目笋干的主要原料；竿节甚突起，不易劈篾，但壁厚坚实，多作竹器柱脚，也作柄材使用。

6b. **紫蒲头灰竹**（栽培型）（植物分类学报）

cv. **Localis**

*Phyllostachys nuda* McClure f. *localis* Z. P. Wang et Z. H. Yu. in Act. Phytotax. Sin. **18** (2): 173. 1980.

与原栽培变型的区别在于老竿的基部数节间有紫色斑块，此斑块甚密以至布满整个