

产北京、江苏，浙江也有栽培。模式标本采自江苏连云港云台山。

本种以其竿色美丽，主要供观赏。

26d. 黄竿京竹 (栽培型) (南京大学学报)

cv. *Aureocaulis*

Phyllostachys aureosulcata McClure f. *aureocaulis* Z. P. Wang et N. X. Ma in Journ. Nanjing Univ. (Nat. Sci. ed.) **1983** (3): 493. 1983.

不同于原栽培型在于竿全部为黄色，或仅基部约一或二间节上有绿色纵条纹，叶片有时亦可有淡黄色线条。

浙江安吉竹种园栽培。模式标本采自安吉竹种园。

本种竿色鲜丽，主要供观赏。

27. 蓉城竹 (植物分类学报) 图版 77: 1—3

Phyllostachys bissetii McClure in Journ. Arn. Arb. **37**: 180. f. 1. 1956. et in Agr. Handb. USDA No. **114**. 25. ff. 14, 15. 1957.

竿高 5—6 米，粗约 2 厘米，幼竿深绿略带紫色，被白粉，节间上部疏生直立的细柔毛，微粗糙，老竿绿色或灰绿色；最长的节间约 2.5 厘米，壁厚 4 毫米；竿环隆起，略高于箨环。箨鞘背部暗绿至淡绿，并微带紫色，先端有时有乳白色纵条纹，被白粉，竿下部的箨鞘有时在背部具柔毛，无斑点或在上部有稀疏至密集的极其微小的斑点，边缘生纤毛；箨耳常存在于中、上部的竿箨上，小形乃至较大而呈镰形，或可无箨耳，绿色或绿带紫色，缝毛少数至数条或有时缺；箨舌拱形或截形，宽于箨片基部或在无箨耳时则箨舌的两侧明显露出，紫色，高 1—2 毫米，边缘生纤毛；箨片狭三角形至三角状披针形，深绿色或深绿色带紫，直立，平直或波状。末级小枝具 2 叶；叶耳及鞘口缝毛通常存在，但易脱落；叶舌中度伸出；叶片长 7—11 厘米，宽 1.2—1.6 厘米。笋期 4 月中、下旬。

产浙江、四川。1941 年由四川成都伴随大熊猫而被引入美国栽培。模式标本采自美国。

竿作柄材或蔑用，笋食用。

28. 乌竹 (安徽农学院学报) 毛壳竹 (植物分类学报)

Phyllostachys varioauriculata S. C. Li et S. H. Wu in Journ. Anhui Agr. Coll. **1981** (2): 49. 1981. — *P. hispida* S. C. Li et al. in Act. Phytotax. Sin. **20** (4): 492, 493. f. 1. 1982.

竿直立，高 3—4 米，粗 1.1—3 厘米，表面有不规则细纵沟；最长节间长 30 厘米，幼竿绿色带紫，微被白粉，有毛，粗糙，节下方白粉环明显，老竿绿色或灰绿色；竿环隆起，高于箨环；节内长 3 毫米。箨鞘薄纸质，暗绿紫色，先端有乳白色或淡紫色放射状纵条纹，并有灰白色密集小刚毛和白粉，边缘生纤毛，竿下部箨鞘的上端有稀疏至稍密的棕色小点；箨耳紫色，镰刀形或微弱，或仅在一侧发达，耳缝与鞘口着生数条弯曲