

10. 箨鞘背部全面被刺毛。
 12. 箨鞘无箨耳及鞘口缝毛, 但其背部被厚白粉
 8. 少穗竹 *O. sulcatum* Z. P. Wang et G. H. Ye
 12. 箨鞘有小形的箨耳, 也有鞘口缝毛, 但背部无明显白粉。
 13. 幼竿有毛; 箨鞘背部无刺毛脱落后所留下的小凹痕
 9. 秀英竹 *O. shiuyingianum* (Chia et But) G. H. Ye et Z. P. Wang
 13. 幼竿无毛; 箨鞘背部留有刺毛脱落后明显小凹痕
 10. 四季竹 *O. lubricum* (Wen) Keng f.

1. 肿节少穗竹 (武夷山科技通讯) 肿节竹 (南京大学学报) 图版 173

Oligostachyum oedogonatum (Z. P. Wang et G. H. Ye) Q. F. Zhang et K. F. Huang 福建竹类 128 页, 图 2-93. 1987. — *Pleioblastus oedogonatus* Z. P. Wang et G. H. Ye in Journ. Nanjing Univ. (Nat. Sci. ed.) 1981(1): 96. f. 3. 1981. — *Clavinodum oedogonatum* (Z. P. Wang et G. H. Ye) Wen in Bamb. Res. 3 (2): 25. pl. 1. 1984.


笋高 4.5 米, 粗 0.8 厘米, 幼竿暗绿色, 有时带紫色, 被白粉, 无毛, 但有散生的黑色细点, 老竿灰绿色, 有白粉垢; 节间长达 33 厘米, 向下缓慢地增粗致使节间呈倒的棒状; 笋环强烈隆起, 高于隆起的箨环; 笋每节常分 5 枝, 也可多至 7 枝或少至 3 枝, 且均近于等粗, 作水平开展。笋箨早落; 箨鞘纸质, 背部绿色带紫, 基部和两侧及顶端均为暗紫色, 被少许成丛的白粉, 笋中、下部的箨鞘在背部有较密的刺毛; 箨耳暗紫色, 易落, 具紫色的缝毛 3—5 条; 箨舌近截形, 高约 3 毫米, 边缘几无毛; 箨片三角状披针形以至带状, 暗紫色, 开展或外翻。叶于每小枝为 2 或 3 片; 叶鞘背部及边缘均无毛; 叶耳狭镰形, 暗紫色, 易落, 边缘具数条缝毛; 叶舌拱形, 高约 2 毫米, 边缘几无毛; 叶片线状披针形, 长 13—25 厘米, 宽 0.7—3.9 厘米, 两面均无毛, 次脉 5—8 对。总状花序长 4—6 厘米, 仅有小穗 2 或 3 枚; 花序柄纤细, 围以逐渐增大的鞘状苞片数片; 花序轴纤细, 无毛; 小穗柄纤细, 长约 1.5 厘米, 无毛或有时具稀疏的柔毛, 具向下抚之微糙的纵向细棱; 小穗含小花数朵乃至 10 余朵, 长 1.5—5 厘米; 小穗轴极易在孕性小花之下脱节, 节间长 2—3.5 毫米; 纵棱及顶端具纤毛; 颖 1—3 片, 第一颖小, 略呈膜质, 第二颖及第三颖类似外稃, 长约 11 毫米, 7—9 脉; 外稃长 (13) 16 毫米, 7—11 脉, 具微糙毛, 先端渐尖呈短芒状, 边缘生纤毛; 内稃长 8—10 毫米, 顶端钝或微凹, 脊之中、上部生有硬纤毛; 鳞被 3; 雄蕊 3, 偶可 4 或 5 枚, 花药长 4—5 毫米; 柱头 2。果实未见。笋期 5 月, 花期 4—5 月。

特产于武夷山脉北段至浙江南部。模式标本采自福建崇安县三港。

本种的节特别肿大, 不宜劈篾, 全竿可作瓜棚豆架用。

2. 云和少穗竹 (南京大学学报) 图版 174: 9, 10

Oligostachyum lanceolatum G. H. Ye et Z. P. Wang in Journ. Nanjing Univ. (Nat.



图版 173 肿节少穗竹 *Oligostachyum oedogonatum* (Z. P. Wang et G. H. Ye) Q. F. Zhang et K. F. Huang: 1. 竿之一节; 2. 开花植株之一节; 3. 笋; 4. 箨; 5. 外稃; 6. 内稃; 7. 鳞被; 8. 雄蕊; 9. 雌蕊。(蔡淑琴绘)