

缘具纤毛；叶舌干膜质，长约 1.5 毫米；叶片长椭圆状披针形，长 6—15 厘米，宽 1—2 厘米，具横脉，上面疏生硬毛，顶端渐尖，基部渐窄，成短柄状或抱茎。圆锥花序长 12—25 厘米，分枝斜升或开展，微粗糙，基部主枝长达 15 厘米；小穗柄生微毛，长 2—4 毫米；小穗含 2—3 小花，长约 5 毫米；颖披针形，具 3—5 脉，脊粗糙，第一颖长 2—2.5 毫米，第二颖长 3—3.5 毫米；第一外稃长约 4 毫米，具 7 脉，顶端具小尖头，第二与第三外稃长 3—3.5 毫米，两侧边缘贴生硬毛，成熟后其毛伸展、反折或形成倒刺；内稃长约 3 毫米，狭窄，脊具纤毛；雄蕊 2 枚，花药长约 1 毫米。颖果椭圆形，长 1—1.2 毫米。胚长为果体的 1/3。花果期 6—10 月。染色体 $x = 12$ (Avdulov 1931, Lar-scen. 1963)。

产台湾、福建、广东、海南、云南、广西、香港。生于林下、林缘和山谷蔽荫处。分布于印度、泰国、马来西亚和非洲、大洋洲。模式标本采自印度。

2. 淡竹叶属* *Lophatherum* Brongn.

Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. 50, pl. 8. 1831.

多年生草本。须根中下部膨大呈纺锤形。秆直立，平滑。叶鞘长于其节间，边缘生纤毛；叶舌短小，质硬；叶片披针形，宽大，具明显小横脉，基部收缩成柄状。圆锥花序由数枚穗状花序所组成；小穗圆柱形，含数小花，第一小花两性，其他均为中性小花；小穗轴脱节于颖之下；两颖不相等，均短于第一小花，具 5—7 脉，顶端钝；第一外稃硬纸质，具 7—9 脉，顶端钝或具短尖头；内稃较其外稃窄小，脊上部具狭翼；不育外稃数枚互相紧密包卷，顶端具短芒；内稃小或不存在；雄蕊 2 枚，自小花顶端伸出。颖果与内、外分离。染色体小型， $x = 12$ 。

属模式：淡竹叶 *Lophatherum gracile* Brongn.

含 2 种，分布于东南亚及东亚。我国有 2 种。

分种检索表

1. 小穗线状披针形，宽 1.5—2 毫米；第一外稃宽约 3 毫米 1. 淡竹叶 *L. gracile* Brongn.
1. 小穗卵状披针形，宽约 3 毫米；第一外稃宽 5 毫米 2. 中华淡竹叶 *L. sinense* Rendle

1. 淡竹叶 (本草纲目) 图版 3: 5, 5a.

Lophatherum gracile Brongn. in Duperr., Voy. Coq. Bot. 50, pl. 8. 1831; Hitchc. in Lingnan Sci. Journ. 7: 196. 1931; Ohwi in Acta phytotax. Geobot. 10: 263. 1941;

* 淡竹叶属见《江苏植物名录》。